


QL 425
.S3 L6

Index Molluscorum
S. Loven



Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
California Academy of Sciences Library

122

E. C. Chaparide A.R.
Berlin 1855.


INDEX MOLLUSCORUM

**LITORA SCANDINAVIÆ OCCIDENTALIA
HABITANTIIUM.**

FAUNÆ PRODRUM

OFFERT


S. LOVÉN.



(ÖFVERSIGT AF K. VET. AKAD. FÖRH. 1846, 13 MAJI, 10 JUNII.)

HOLMIÆ,

P. A. NORSTEDT ET FILII, MDCCCXLVI.




INDEX MOLLUSCORUM

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Operis fautores grata mente salutatur auctor Sars et Koren, qui Bergensia dederunt ditissima, Nilsson, M. v. Düben, Boeck, Esmark, Rasch, Krøyer, quibus Norvegica et Suecica varia, Ørsted cui Kullensia et Danica debet. Bohusica, Finmarkensia ipse collegit.

Fines, ad meridiem promontorium Kullen, ad septentriones sinus Varanger.



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

MAR 31 1930
Oppermann
25126

INDEX MOLLUSCORUM

litora Scandinaviæ occidentalia habitantium.

Cephalopoda.

Ametabola, natantia; velum capitis ab ovo persistens, brachia emittens acetabulis, uncinis l. cirris sæpius armata; pes in tubum propulsorium efformatus.

Cfr. Öfvers. af K. Vet. Acad. Förh. 1845, 121.

Eledone ARIST., LEACH.

1. *E. cirrosa* LAMK., D'ORB. = *S. octopodia* PENN.

Boh. — Norv. med.

Sepioteuthis LEACH.

2. *S. Rondeletii* LEACH.

Boh. — Norv. med.

Rossia OWEN.

3. *R. Owenii* BALL.

Boh.

4. *R. glaucopsis* n. — Pinnis mediis, brachiis membrana basali connexis, acetabulorum serie duplici armatis, tentaculis gracilibus, membrana apicali dimidio infra basin tori sita; 85 mm. Finm.

Onychoteuthis LIGHT.

5. *O. Bergii* LIGHT.

Boh. — Finm.

Loligo LAMK.

6. *L. vulgaris* LAMK.

Fr. sund. — Norv.

7. *L. media* (Sepia) L. = *L. subulata* LAMK.

Boh. — Norv.

Ommatostrephes D'ORB.

8. *O. Todarus* D'ORB.

Boh. — Finm.

Sepia L.

9. *S. officinalis* L.

Fr. sund. — Norv.

Pteropoda.

Clio L.

10. *C. borealis* LAMK. = *C. retusa* O. FABR.; *annon* = *C. miquelonensis* RANG.?

Sin. cod. (Beck). — Finm.

Limacina LAMK.

11. *L. arctica* (Argonauta) O. FABR.

Finm.

Spirialis EYD. et SOUL.

Peracle FORB. Scæa PHIL.

12. *S. stenogyra* (Scæa) PHIL.

Finm.

Gasteropoda.

Metabola, primum natantia, deinde reptantia; velum prima ætate motus solum instrumentum, ciliis præditum vibrantibus, deinde aut persistens sed iners, aut omnino evanidum; pes primum iners, operculigerus, postea solea reptili instructus.

- I. Testa spiralis in juvene, in adulto nulla; velum persistens iners.

Gymnobranchia.

A. Doridea.

- a. Vibracula recondenda.

Doris L.

- *) Branchiæ recondendæ.

13. *D. tuberculata* CUV. JOHNST. = *D. pseudoargus* "RAPP" BOUCH. CHANT. — Coriacea, rigida. Pictura varians: lutescens, fusca, rosea, purpurea, luteo l. fulvo nebuloza, fusco maculata; branchiæ 8—14. Dimens. $\frac{3}{11}$ mm., $\frac{4}{13}$ mm., $\frac{9}{18}$ mm. Specimen hocce giganteum, ab am. BOECK delineatum, poros pallii præbuit admodum distinctos, ad latera majores. Tubercula dorsi majora areola cincta lævi, granulorum circulo definita. Boh. — Norv. bor.
14. *D. obvelata* MUELL. (non O. FABR., non JOHNST., non BOUCH. CHANT.) = *D. repanda* A. & H. Kull. — Boh. — Norv.
15. *D. lævis* L. MUELL. Boh.
16. *D. fusca* MUELL. sec. descr., non O. FABR.; non *Limax bilamellatus* L. F. S. ed. 2, 2094, vermis intestinalis, pro quo in S. N. 1083, sub nomine *D. bilamellata* substitutum specimen KOENIG ex Islandia Doridis veræ, cujus icones ap. MUELL. l. c. — Obovata, mollis, pallio convexo papillis obsito conicis, acuminatis. Vibracula longiuscula, gracilia, recurva, dimidio lævia; branchiæ amplæ circ. 8; rufofusca, cinereo l. sulphureo punctata; $\frac{10}{5,4}$ mm., $\frac{4}{21}$ mm. Boh.
17. *D. tomentosa* CUV. non PHIL.; an = *D. similis* A. et H? — Ovata, mollis, alba; pallio convexo papillis flavidis lanceolatis longiusculis obsito. Vibracula vagina defensa expansa, margine laciniato-dentata; branchiæ 7—8 validæ; velum incisura media in lobos duos divisum (?); $\frac{1}{5}$ mm. Spec. unic. vidi sp. v. conserv. (KRÖYER dd.) Norv.

**) Branchiæ non recondendæ, minutæ, coronam postice interruptam formantes; corpus verrucosum, spiculis rigidum.

18. *D. muricata* MUELL. Sars. — Obovata, convexa, luteo-alba, pallio amplo, verrucis prædito parum confertis, magnis, subpedunculatis, truncato-clavatis. Verrucæ dorsales et laterales maximæ, marginales mediocres, interspersis undique minoribus, gracilibus, maximas hic et illic cingentibus; branchiæ circ. 8—10, minutæ, pinnatæ, in ellipsin postice interruptam dispositæ; anus tuberculis cinctus, discum stellatum interdum formantibus; velum utrinque in lobum ovalem productum; $\frac{20}{14}$ mm. — β) pallio subpellucido, spiculis dense intexto, verrucis confertis, numerosis, minoribus, clavatis, e spiculis porrectis asperis, interadditis nonnullis minutis, branchiis 10—11; $\frac{10}{3.6}$ mm. Boh. — Norv.

19. *D. echinata* n. an = *D. affinis* A. et H.? — Obovata, alba, depressa, pallio subpellucido papillis rigidis, conicis, mucronatis muricato, pedem parum excedente; papillæ subseriatæ, magnæ, interspersis minutis; vibracula gracilia, tota perfoliata; branchiæ sex; $\frac{12}{6.4}$ mm. Boh.

aa. Vibracula non recondenda.

b. Pallium simplex, læve.

Goniodoris FORB.

A Brachychlanide EHRENB. vix diversa.

20. *G. nodosa* (Doris) MONT. = *D. Barvicensis* JOHNST. = *G. elongata* THOMPS. = *G. emarginata* FORB. Boh.

bb. Pallium papilligerum.

c. Frons truncata mutica.

Idalia LEUCK.

Euplocamus PHIL. Utrumque nomen prius adhibitum, hoc in Lepidopteris, illud in Terebellis, v. R. A., V, 420; III, 194.

21. *I. cirrigera* PHIL. = *Id. aspersa* A. et H., an = *I. caudata* ÖRST.? — Corpus crassum, altum, abdomine gibbo, fronte declivi, pallio pedi æquilato, abbreviato, cirris circ. sedecim, quorum 4 ante tentacula longiores, 2 utrinque laterales remoti, breves, 4 utrinque juxta branchias mediocres. Vibracula gracilia, setacea, utrinque anguste perfoliata, antice subcarinata, postice subsulcata. Cirri laterales postici apud PHIL. modo tres utrinque, quorum tamen unus bifidus. Tale specimen vidi, nec numerum cirrorum pro caractere bono habeo, interdum enim perduntur, cfr. A. et H. t. 26 f. 1. Boh.

Ancula n.

Corpus elongatum, gracile; pallium omnino adnatum, cirris dorsalibus styliformibus ornatum; velum labiale utrinque in papillam brevem productum; vibracula perfoliata, basi stylis armata.

22. *A. cristata* (Polycera) ALD. — Gracilis, dorso gibbo, fronte producta; vibracula longa, valida, tertia parte basali lævia, ibidemque antice cirris binis subulatis aucta; branchiæ tres ano præpo-

sitæ, pinnatæ; cirri laterales subclavati utrinque tres, addito uno l. altero pone anum. Pellucido-alba, cirris apice pallide sulphureis, branchiis niveo punctatis; 12 mm. Boh.

cc. Frons rotundata papilligera.

d. Branchiæ indefensæ.

Triopa JOHNST.

23. *T. claviger* (Doris) MUELL., Gm. (excl. syn. BOMMEI), = *Eupl. plumosus* THOMPS. Boh.

24. *T. lacer* (Doris) MUELL. non Cuv. — Corpus oblongum, postice attenuatum, altum. Pallium convexum, in fronte dilatatum, papillis fimbriatum filiformibus, antice confertioribus, in dorso rarioribus subseriatis. Branchiæ in quarta parte postica, circ. 5 amplæ, tripinnatæ. Solea latiuscula, margine superne granulosa. Velum utrinque truncatum, plicatum, subauriforme ut in priore. Albus, cirris, branchiis et vibraculis sulphureis; $3\frac{1}{2}$ mm. Finm.

dd. Branchiæ papillis defensæ.

e. Vibracula perfoliata, nuda.

Polycera Cuv.

25. *P. cornuta* (Doris) ABILDG. = *D. quadrilineata* MUELL. = *D. flav* MONT. = *P. ornata* D'ORB. = *P. varians* Sars. Kull. — Norv.

26. *P. modesta* n. — Virescens, sulphureo maculata, papillis frontis 8—10, verrucæformibus, branchialibus utrinque binis bifidis; 10 mm. Boh.

27. *P. plebeja* n. — Viridifusca, sulphureo maculata, papillis frontis 10, branchiali utrinque uno, postica, majore; 11 mm. Boh.

28. *P. pudica* n. — Olivacea, croceo maculata, papillis frontis 12—16, branchialibus utrinque quatuor; 22 mm. Finm.

29. *P. dubia* Sars. — Olivacea, tuberculosa, papillis frontis 8, branchialibus utrinque septem; 20 mm. Bergen.

ee. Vibracula simplicia vaginata.

Aegires n.

30. *A. punctilucens* (Polycera) D'ORB. cfr. Öfv. K. Vet. Förh. 1844, 49. — *Ootheca funiculus spiralis*. Boh. — Norv.

B. Tritoniacea.

Tritonia Cuv.

31. *T. Hombergii* Cuv. Boh.

32. *T. plebeja* JOHNST. Boh.

Dendronotus A et H.

33. *D. arborescens* (Doris) MUELL., FABR. = *Amphitrite frondosa* ASCAN., (Doris) MUELL. = *T. Ascanii* Sars = *T. Reynold-*

sii COUTH. etc. — *Pictura varians*: fusca, maculosa — roseo-alba. Boh. — Finn.

Obs. Inquirenda *Tethys arborescens* var. RATHKE, Nat. hist. Selsk. Skr. V, I, 90, t. 3 f. 13, ad Molde capta.

Doto OKEN.

34. *D. coronata* (Doris) GM., A & H., (Tritonia) CUV., LAMK., (Melibæa) JOHNST., (Tergipes) D'ORB. = *Scyllæa punctata* BOUCH. CHANT. — *Pictura varians*: albida purpureo varia, branchiis coccineo maculatis, isabellina unicolor, olivaceo striolata, fulva niveo variegata. Branchiarum numerus inconstans. Boh.

C. Eolidea.

Cloelia n.

35. *C. formosa* n. l. c.; an = *Trit. velata* ØRST.? Boh.
36. *C. fimbriata* (Doris) VAHL. Norv.

Hermæa n.

37. *H. bifida* (Doris) MONT. v. l. c. Boh.
38. *H. venosa* n. l. c. Boh.

Tergipes CUV.

Solea antice simplex. — *Ootheca saccus*.

39. *T. lacinulatus* (Doris) GM. = *Limax tergipes* FORSK. = *Acolis neglecta* JOHNST. A & H. — Velo utrinque tentaculiformi; branchiis clavatis, mucronatis. Albida fusco maculata, branchiis apice albis. Branchiarum utrinque aut singula series aut duplex l. triplex subfasciculata; illa juniorum nota; 10 mm. — *Ootheca saccus ovalis plicatus*. Fret. sund. — Boh.
40. *T. fustifer* n. — Velo prioris, branchiis in fasciculos utrinque 6—7 digestis, validis, elongatis, tuberculosis. Pellucido alba, fusco maculata, vasibus fuscis; 8 mm. Boh.
41. *T. bullifer* n. — Velo utrinque papillam brevem formante, branchiis inflatis bullaceis, uniseriatis. Alba fusco varia; 7 mm. Kullen.

Acolis CUV.

Solea antice cornuta. — *Ootheca funiculus*.

42. *A. papillosa* (Limax) L. S. N. (non F. S., qui quoad speciem non determinandus), BAST. Op. subs. t. 10 f. 1; (Doris) MUELL. (non RATHKE Z. D. IV, t. 149, vix O. FABR.), GM. (excl. syn. FORSK. et A. VLISS.), MONT. JOHNST. = *D. bodoensis* GUNN. A. Havn. X, 170. Kull. — Boh. — Norv.
43. *A. obtusalis* A. et H. Boh.
44. *A. tricolor* (Eubbranchus) FORB. A. et H., cur non = *D. cærulea* MONT.? — Dorsum anticum virens, vibracula rosea; solea brevifurcata; anus subdorsalis. Funiculum ovorum compressum, 4

- mm. latum, subspiralem, 25 mm. longum, ovis roseis plenum, margine inferiore incrassatum peperit spec. 45 mm. Boh.
45. *A. branchialis* MUELL. Z. D. IV, 33 (excl. syn.), t. 149 f. 5—7; *annon* = *Ae. rufibranchialis* JOHNST.? Boh. — Norv.
46. *A. alba* A. et H. — Branchiæ in meis sæpius testaceæ, niveo punctatæ, sed inedia decolorantur. Boh.
47. *A. lineata* n. — Gracilis, albida, vibraculis concoloribus, medio-cribus, branchiis in series utrinque novem digestis, coccineis, lineis cujusvis tribus longitudinalibus, linea utrinque laterali, tertia dorsali media in cirris veli excurrente, et stria vibraculorum postica niveis; solea brevilunata; 10 mm. Boh.
48. *A. bellula* n. — Gracilis, alba, vibraculis roseis, approximatis, fere contiguis, setaceis, fronte rotundata; cirris veli elongatis, gracilibus; branchiis 8—9-seriatis, rufotestaceis, tertia parte apicali isabellinis; solea vix lunata; 15 mm. Boh.
- Obs. adde *D. fasciculatam*, *D. auriculatam* MUELL. etc.

Alderia ALM., A. et H.

49. *A. modesta* (Stiliger) n. l. c. Boh.

Placobranchus v. HASS., QUOY et GAIM.

50. *P. viridis* (Aplysia) MONT. (Actæon) OKEN = *A. minutum* SARR. — Nomen OKENII a MONTFORTIO Tornatellæ datum non accipiendum. — Ootheca funiculus spiralis, gracilis. Pulli quales *Aeolidis*, v. l. c. et Vet. Ak. Handl. 1839. Kull. — Boh. — Finn.

Limapontia JOHNST.

51. "*L. nigra* JOHNST. = *Planaria limacina* O. FABR. = *P. capitata* MUELL." (ÖRSTED, BOECK dd.) Kullen. — Norv.

Diphyllidia CUV.

52. *D. lineata* OTTO. cfr. Öfvers. l. c. Kullen. — Bohusl.

II. Testa persistens, in juvene spiralis; velum sæpissime evanidum.

Pleurobranchus CUV.

53. *P. sideralis* n. — An. album, subpellucidum; pallium obtuse ovatum; vibracula brevia, tubulosa, superne fissa, truncata, approximata, prona; velum utrinque transverse productum; solea ovata, antice truncata; pallium tenue, spiculis stellatis 4- l. 5-radiis, lucidis, dense conspersum; 5 mm. — T. oblonge ovata, subpellucens, striis incrementi subrudis, longitudinaliter striata punctis minutissimis cavis, rotundis l. ovalibus et passim in va-

rias formas confluentibus, spira minuta mamillari; 4 mm. — P. stellato RISSO affinis. Boh.

Aplysia L.

54. *A. punctata* CUV., LAMK., FLMG. = *A. guttata* Sars = ? *A. rosea* RATHKE. — Olivaceo-virens l. roseo-purpurea nigro striolato-punctata, maculis majoribus albis. Boh. — Bergen.

Akera MUELL.

Non Akera CUV., LAMK., DESH., PHIL., quæ = *Doridium* MECK., quod genus ad Philinen (Bullæam LAMK.) eodem modo sese habet ac *Cryptophthalmus* EHRENB. ad *Akeram* MUELL.

55. *A. bullata* MUELL., CHEMN. X, 1358 = *Bulla akera* GM., MONT. = *B. resiliens* DON. = *B. fragilis* LAMK., DESH., CANTR. = *B. norvegica* BRUG. = *B. flexilis* BROWN. — Sutura spiræ depressæ canaliculatam explet pallium connatum cirrum emittens longum, tenuem, filiformem. Ootheca funiculus varie tortus. Kull. — Finn.

Philine ASCANIUS (1772).

Lobaria MUELL. (1776), GM.; *Bullæa* LAMK. Rec.

56. *P. quadripartita* ASCAN. = *Lob. quadriloba* MUELL. GM. = *Bulla aperta* MONT. *non* L., sed GM. ex parte, = *B. aperta* LAMK. = *B. planciana* LAMK. PHIL. — Segnis, mucosa, limicola, prof. 10 — 20 org. Ootheca capsula gelatinosa, hydrophana, ovata, 30 mm., ova continens numerosissima serie simplici in funiculum longissimum monilarem laxè spiralem disposita. Pullum descripsi, Öfvers. af K. Vet. Ak. Förh. 1844, 51, t. 1 f. 7, 8, testa tectum spirali, ope veli vibrantis natantem, oculis orbatum, operculo præditum. Kull. — Bergen.
57. *P. pruinosa* (Bullæa) CLARK. — An. parum depressum album, linea clypei, limbis omnibus punctisque sparsis niveis; clypeus vibraculorum quadrato-ovatus, antice emarginatus; solea æque lata ac longa, dimidium totius an. fere superans, antice utrinque incisa, lateribus alata, alis crassis revolutis, margine digitato laciniatis; pallium medio dorso apertum, postice productum, medio incisum, margine laciniatum. Boh.
58. *P. scabra* (Bulla) MUELL. = *B. pectinata* DILLW., WOOD. = *B. granulosa* Sars. — *B. angustata* PHIL. proxima ut et *B. lineolata* COUTH. Boh. — Bergen.
59. *P. scutulium* n. — T. quadrato-ovalis, antice subtruncata, alba, subpellucida, fasciis binis, incrassatis, striis excavato-punctatis, alternis sæpe tenuioribus sculpta, margine integro; anfractus sesqui; apex minutus, rimatus, vix umbilicatus, rotundatus; labrum postice parum productum, dein leviter impressum, subrectum; margo columellaris sinuato-arcuatus, apertura patentissima; $3\frac{5}{8}$ mm. Forma *P. quadripartitæ*, sculptura fere *P. scabræ*. *B. punctata* AD., CLARK et *B. quadrata* WOOD affines. Finn.

Scaphander MONTF.

Bulla L. AUCT. Alicula EHRENE.

60. *S. lignarius* (Bulla) L. MONT. LAMK. Boh. — Bergen.
 61. *S. librarius* n. — Præcedenti simillimus, clypeo rhomboideo, postice fisso, alis soleæ brevibus. Testa fere eadem, minor, exacte elliptica, apice subtruncata, subumbilicata, labro continue arcuato, non impresso; sculptura eadem ac in priore, cui proxima ut *P. catena* *P. scabræ*; $\frac{18}{11}, \frac{3}{8}$ mm. Berg. — Finn.
 62. *S. Cranchii* (Bulla) LEACH, FLMG.; *vix* = *B. cornea* LAMK. *non* CANTR. — Epidermis cornea, nitida. — *B. insculpta* TORT., *B. utriculus* BROCCHI valde affines. Boh.

Cylichna n. g.

Animal breve, latum; caput depressum, subquadratum, antice truncatum; vibracula lata, deplanata, libera, recumbentia, transversa; oculi sub eorum basi immersi; solea brevissima, ovato-quadrata; pallium limbo incrassato aperturam postice claudens. Testa cylindrica l. fusiformis, columella callosa l. plicata.

63. *C. cylindræa* (Bulla) PENN., ANGL., = *B. convoluta* BROCCHI, Sow. Kullen. — Boh.
 64. *C. alba* (Bulla) BROWN, = *B. triticea* COUTH., GOULD = *B. corticata* MÖLL. Bergen. — Finn.
 65. *C. truncata* (Bulla) AD., MONT., PHIL., S. V. WOOD = *B. retusa* MAT. et RACK. — Pullum l. c. descripsi. Boh. — Norv.
 66. *C. strigella* n. — *T. cylindræa*, postice subtruncata, striis spiralibus tenuissimis undulosis sculpta, apex umbilico minuto tereti, profundo perforatus, periomphalo solido, niveo; labrum parum recedens; columella callosa, plica distincta; aut nuda nitida, aut epidermide fusca tecta, hæc breviuscula, sic de *C. alba* BR. monens; $\frac{2}{3}$ mm. Boh.
 67. *C. umbilicata* (Bulla) MONT., FLMG., JOHNST., *vix* MACGILL.; *an* = *B. truncatula* BRUG., PHIL.? Boh.
 68. *C. nitidula* n. — Præcedenti affinis, alba, nitens, lævigata, sed magis elongata, postice attenuata, columella vix sinuosa, plica evanida; $\frac{3}{1}, \frac{1}{4}$ mm. Boh.
 69. *C. acuminata* (Bulla) BRUG., BROCCHI, PHIL. Boh.

Amphisphyræ n. g.

Utriculus BROWN, sect. sec.; Bulla TURR.

Animal testa recondendum, crassum, latum; caput latum, breve, transversum; vibracula brevia, conica, remota, lateralia; oculi postici, minuti, immersi, remoti; labia tumida buccam formant inflatam, verticalem, antice impressam, medio os præbentem minutum; solea testa brevior, subquadrata, antice dilatata, truncata, postice fissura media in lobos duos divisa; margo pallii leviter incrassatus, aperturam

lambens. Structuram insolitam in duabus speciebus, tribus speciminibus eandem observavi. — *T. bullacea*, tenuis, ovata; apex truncatus; spira depressa medio anfractum primum juvenilem præbens mammillarem, inflatum, hyalinum.

70. *A. globosa* n. — *T. perforata*, tenuissima, hyalina, epidermide tecta, subglobosa, postice leviter angustata, truncata; anfractus spiræ 2—3, sutura canaliculata distincti; apertura obpyriformis, antice producta, postice sinum angustum præbens; labrum sub angulo obtuso abiens, dein deflexum, leviter impressum, antice large arcuatum, productum; columella subrecta, leviter recedens, vix reflexa; umbilicus parvus subobtectus; $\frac{3}{4}$ mm. Boh. — Finm.
71. *A. pellucida* (Utriculus) BROWN, JOHNST. Boh.

Acteon MONTF.

72. *A. tornatilis* (Voluta) L. = *Tornatella fasciata* LAMK. Boh. — Bergen.
73. *A. tenellus* n. — *T. ovata*, subtenuis, virescens, fusco transverse lineata; anfr. quatuor, ultimo $\frac{5}{8}$ t. t. æquante, juxta suturam lineis duabus, per $\frac{2}{3}$ basales lineis circ. 13 distinctioribus punctatis cincto, spatio intermedio omnino lævi, sutura subcanaliculata; $\frac{3}{2}$ mm. — *T. pellucida* MACG. differt forma graciliore, fasciis rubris, *T. pusilla* MACG. ambitu fusiformi, *T. puncto-striata* AD. spira productiore, apertura non ultra $\frac{5}{8}$ t. t. Kullen.

Tritonium MUELL.

*) Ommatophori velo connati.

a) Cauda producta; operculum unguiculatum, nucleo apicali.

74. *T. antiquum* (Murex) L. — α) anfr. lævigatis = *M. antiquus* L., PENN., TURT., WOOD, (Trit.) MUELL., (Fusus) LAMK., FLMG., BLV., = *M. despectus* PENN., MONT, — β) anfr. carinatis = *M. despectus* L., DAC., (Trit.) MUELL., O. FABR., (Fusus) LAMK., FLMG., = *M. subantiquatus* TURT., WOOD, = *M. carinatus* PENN., DON., TURT., (Fusus) LAMK., = *M. antiquus* MONT. = *M. duplicatus* DON. — Carinati in mari arctico frequentiores. Kullen. — Vardöe.
75. "*T. norvegicum* (Strombus) CHEMN." "Norv."
76. *T. islandicum* (Fusus) CHEMN. f. 1312—1313, (Murex) GM., LAMK., WOOD, non KIENER. — *T. fusiformis*; anfr. (6—9) convexi, transverse rugosi, cingulis obducti elevatis; epidermis tenuis, plicata, ciliata; $\frac{5}{8}$ mm., spec. immatur. (RASCH dd.) Norv.
77. *T. gracile* (Buccinum) DAC. = *Murex* (Fusus) corneus ANGL., (non L.) = *B. angustius* (LISTER) WOOD, nomen comparativum ante-Linneanum non legitimum. — *T. elongato fusiformis*; anfr. fere plani, striis spiralibus obducti; epidermis lævis, tenax, nitida; $\frac{5}{8}$ mm. Kullen. — Vardöe.

78. *T. Holböllii* (Mangelia) MÖLLER, *an* = *Bucc. rosaceum* GOULD?
— *An hujus generis? Vibracula individui in spiritu vini servati*
latissima, lobiformia, rotundata. Bergen. — Finm.

79. *T.?* *nanum* n. — *T. ovato-fusiformis, tenuis, pellucida, alba;*
anfr. 6 striis obducti punctatis, sutura submarginata, apert.
dimidiam t. æquante, canali brevi, subangusto, leviter sinistror-
sum flexo; 2 $\frac{5}{8}$ mm. — Vibracula gracilia; linguæ armatura aliena,
fere qualis in Mangilia costata. Finm.

b) *Cauda truncata; operculum ovale, nucleo laterali.*

80. *T. undatum* (Buccinum) L. Auct. Kull. — Finm.

81. *T. Humphreysianum* (Buccinum) BENN., THORPE. = *B. anglica-*
num FLMG., MACG., (*non* GM., LAMK., CHEMN. IV, f. 1212.)
Boh. — Finm.

82. *T. cyaneum* (Buccinum) BRUG. Norv. med. — Finm.

(**) *Ommatophori liberi.*

a) *Testa caudata, laminoso-varicosa. (Trophon MÖLL., vix MONTF.)*

83. *T. clathratum* (Murex) L. S. N. ed. 12, n. 563 (excl. syn.
Kleinii), GM. (excl. syn. Listeri, Kleinii), O. FABR., MUELL., MOHR,
MÖLL., (*non* GUNNERUS, *non* WOOD) = *B. truncatum* STRÖM, MUELL.,
GM. = *Murex Bamffius* DON., MONT., TURT., (*Fusus*) FLMG., THOR-
PE, GOULD, (*Pleurot.*) MACG. = *F. laminosus* JEFF. — (Obs.
Var. β major, $3\frac{2}{3}$ mm., apud nos viva nondum inventa, maris
Spitzbergici incola = L. It. Vestr. 199 t. 5 f. 6, in S. N. sub
M. corneo subsumta, = M. Bamffius DON. = M. lyratus LAMK.
= B. lamellatum GM., KÄMM. = Fus. lamellosus GRAY = F. pe-
ruvianus Sow. = F. scalariformis GOULD.) — *T. ovato fusiformis,*
ventricosa, rufescens, varicibus 15–20 simplicibus, cauda
subtruncata; 1 $\frac{2}{3}$ mm. Kull. — Finm.

84. *T. Gunneri* n. = *M. clathratus* GUNN. A. Nidr., (*non* L.) =
Troph. Bamffium MÖLL., *non* DON. — *T. ovato fusiformis, rosea,*
varicibus 9–10 albis postice auriculato cristatis, canali aper-
turae dimidium æquante; 2 $\frac{5}{8}$ mm. Nordl. Finm.

85. *T. Barvicense* (*Fusus*) JOHNST. — *T. fusiformis, alba, contabu-*
lata, varicibus 13–16 lamellosis, imbricatim undato-crispis, ca-
uda gracili longiuscula, leviter sinistrorsum curvata; 1 $\frac{3}{4}$ mm.

Boh. — Norv.

b) *Testa brevicauda, costata. (Defrancia MÖLL., non MILL.)*

86. *T. pyramidale* (Buccinum) STRÖM, N. A. Dan. III, 296 f. 22,
= *Fus. pleurotomarius* COUTH. = *F. rufus* GOULD, (*an* (*Murex*)
MONT.?) = *Defrancia VahlII* "BECK", MÖLL. Norv. bor. — Finm.

87. *T. turricula* (*Murex*) MONT., GOULD = *M. angulatus* DON., (*an*
(*Pleurot.*) KIENER?) = *Defr. nobilis* MÖLL. Kull. — Finm.

88. *T. harpularium* (*Fusus*) COUTH., GOULD. Christiansund. — Finm.

89. *T. roseum* Sars ms. — *T. fusiformis, graciliuscula, rufa, can-*
cellata costis circ. 13, apertura dimidiam longitudinem æquante.

— Priore gracilior; anfr. 6—7 convexi, tumiduli, postice angulati, planulati, cingulis obducti linearibus, pone angulum tenuissimis, in medio anfr. majoribus, interpositis hic et illic tenuioribus; costæ validæ, elevatæ, postice subsigmoideæ, in angulo subnodosæ, in cauda evanidæ; sutura profunda; apertura angusta, margine columellari postice vix sinuato, canali lato, subcompresso; labrum album acutum, postice ad angulum sinuatum; fauces obscure fusæ; $\frac{10.5}{4.2}$ mm. Differt a *T. harpulario* forma graciliore, anfr. magis tumidis, sutura profundiore, costis multo validioribus. (SARS dd.) Bergen.

90. *T. mitrula* n. — *T. fusiformi*, turrata, alba, cancellata, costis circ. 25, apertura $\frac{4}{5}$ t. t. æquante. — Gracilis, spira producta; anfr. 7 contabulati, postice planulati, carinato-angulati. Costæ angustæ, pone carinam subobsoletæ, inflexæ, ad medium anfr. ultimi evanidæ; cingula superducta pone carinam exilissima, obsoleta, ante eam valida, costas fere æquantia, in anfr. ultimo 20, in penult. 6, in antepenult. 4; apert. latiuscula, canali abbreviato; $\frac{10}{4}$ mm. Boh.

91. *T. reticulatum* (Pleurotoma) BROWN. = "*Pleur. decussata* MACG." REEVE 159, non MACG. Boh. — Finm.

92. *T. declive* n. — *T. elongato-fusiformis*, alba, cancellata, costis circ. 12, apertura dimidiam t. long. vix æquante. — Spira producta; anfr. 7 convexi, postice obtusanguli, subplanulati; costæ elevatæ, angustæ, subobliquæ, pone angulum sigmoideæ, caudam attingentes; cingula superducta pone angulum obsoleta, ante eum crassa, rotundata, in anfr. ult. circ. 15, interjecto passim tenuiore, per caudam continuata; cauda longiuscula; $1\frac{5}{8}$ mm. Finm.

Defrancia MILL.

Ommatophori liberi, graciles; vibracula setacea; solea depressa, antice biloba, utrinque cornuta; penis dexter filiformis; operculum nullum.

93. *D. linearis* (Murex) MONT. (Pleurot.) BLV., KIENER, PHIL. Boh. — Bergen.

Mangilia LEACH.

Ommatophori liberi inflati; vibracula subclavata, breviuscula, solea antice truncata, sulco undique a pede discreta, antice subbiloba; penis filiformis, operculum nullum.

94. *M. attenuata* (Murex) MONT., (Fusus) FLMG., (Pleurot.) BLV., PHIL. c. syn. Boh.

95. *M. costata* (Buccinum) DAC., (Murex) MONT., DON. Boh. — Bergen.

96. *M. nebula* (Murex) MONT., (Fusus) FLMG., THORPE, (Pleurot.) BLV. REEVE = *Pl. ginnanianum* "SCACCHI" PHIL. — Forma nostra anglicanis sæpius nonnihil crassior, (an Woodianis fossilibus e form. *Crag dicta similis*?) flavida interstitiis costarum nigrofuscis; costæ 8 l. 9, striæ spirales densissimæ, transversis creberrimis sig-

moideis decussatæ, hinc passim moniliformes; linea "filum simulans" ad suturam in junioribus conspicua. Boh. — Bergen.

97. *M. tiarula* n. — *T. fusiformi-turrita*, anfr. 8 convexi postice angulati; costæ octo l. novem, crassæ, elevatæ, postice subgibbæ, abrupte depressæ; striæ transversæ confertissimæ, ante suturam inflexæ, magisque distinctæ; cingula spiralia pone angulum confertiora et moniliformia, præsertim prope suturam undulatam, ante angulum rariuscula, tenuissime rugulosa, in penultimo 6—7, in ultimo 15—17, interaddito passim exilissimo; apertura $\frac{3}{8}$ t. t. long. æquans, oblonga; $\frac{8}{2,5}$ mm. Boh.

***Pleurotoma* LAMK.**

98. *P. boreale* PHIL. ms. — *T. fusiformi-turrita*, rubicunda, flammulis transversis rufis; anfr. fere 9, subteretes, rotundati, ecostati, cingulis obducti exquisite exaratis, rotundatis, in anfr. antepenult. 8, in penult. 10, in ult. 25, posticis binis tenuibus, mediis alterne crassioribus, geminatis, in cauda gracilioribus, æqualibus; sulcus suturalis subplanus, declivis, arcuatim striatus; labrum tenue, large productum; fissura suturam premeans angusta, profundissima; apertura $\frac{7}{16}$ t. t. long. æquans, oblonga, canalis latiusculus, leviter recedens; cauda brevis; $\frac{1,6}{3,8}$ mm. — *P. tereti* FORB. affine, sed diversum numero cingulorum multo majore (*M. v. DUEBEN*, Sars dd.). Bergen.
99. *P. nivale* n. — *T. fusiformis turrita*, nivea; anfr. fere 9 cingulis capillaceis confertis, undulatis undique obducti, parum convexi, postice leviter concavi, ante medium angulati nodulisque præditi obliquis, in costas parum conspicuas excurrentibus, in penult. circ. 15, in ultimo sensim evanidis; apertura dimidiam t. long. non attingens, oblonga; canalis latiusculus; labrum tenue productum, sinu parum profundo, a sutura remoto; cauda brevis; $\frac{1,6-6}{3,6}$. — *Pl. torquato* PHIL. affine, sed multo gracilior striisque incrementi parum conspicuis. Bergen. — Finm.

***Murex* L.**

100. *M. erinaceus* L. Sin. Cod.

***Nassa* LAMK.**

101. *N. reticulata* (Buccinum) L., CHEMN. IV, f. 1164. — Costæ in nostris numerosæ, usque ad 30, color cærulescens fasciis albidis, anfr. rotundati. Alteram formam, *B. vulgatum* GM., nondum apud nos vidi. Kull. — Norv.
102. *N. incrassata* (Buccinum) STRÖM, LAMK. DESH., = *B. coccinella* LAMK. = *B. ascanias* PHIL. — β) = *Ranella pygmæa* LAMK. = *Tritonia varicosa* TURT. = *Bucc. tritonium* BLV., annon propria species? Boh. — Finm.

***Purpura* BRUG.**

103. *P. lapillus* (Buccinum) L. AUCT. Kull. — Finm.

***Cancellaria* LAMK?**

104. *C. viridula* (Tritonium) O. FABR., MÖLL. in litt. ad PHIL. = *C. Couthouyi* JAY, GOULD, = *Admete crispa* MÖLL., *vix* = Mur. *costellifer* Sow. ut vult S. V. Wood. Bergen. — Finm.

***Trichotropis* Sow.**

105. *T. borealis* Sow., GOULD = *T. acuminata* JEFFR. = *Fusus umbilicatus* BROWN, (Trich.) MACG., = *T. costellatus* COUTH. = *T. atlantica* "BECK", MÖLL.; *annon* = Mur. *carinatus* LASKEY WERN. Mem. II, t. 8 f. 9, ad ideam *M. carinati* DON. veri nonnihil accommodatus? Bergen. — Finm.

***Velutina* GRAY, BLV.**

Ommatophori velo connati; proboscis recondenda valida; lingua fere Naticæ; pallium margine inflatum, in canales duos plicatum, branchialem sinistrum anticum, analem dextrum sublateralem.

106. *V. haliotoidea* (Helix) O. FABR., MÖLLER, = *Bulla velutina* MUELL. = *Hel. lævigata* MONT., TURK. Dict. 69 (excl. var.), (*Velutina*) GOULD. — Angli duas sub uno nomine confundisse videntur. Kull. — Finm.

107. *V. plicatilis* (Bulla) MUELL., (*Velutina*) SARS = *B. flexilis* MONT., LASKEY, (*Sigaretus*) BROWN, (*Coriocella*) MACG. — Pallium testæ basin excedit et amplectitur; color aurantio fulvus. Boh. — Finm.

***Lamellaria* MONT.**

Sigaretus CUV., GRAY, FLMG. etc. *non* ADANSON; *Coriocella* BLV., PHIL.; *Marsenia* LEACH.

108. *L. perspicua* (Helix) L. (*Sigaretus*, *Coriocella*) GRAY, PHIL., = *Bulla haliotoidea* MONT., (*Sigaretus*) FLMG., *non* LAMK. — Pallium convexum domatum, crassum, tuberculosum, cineraceum, nigro striolatum, fulvo maculatum, plica antica media. — *T. obovata*, convexa, antice latiuscula, nitida, pellucens, fascia spirali media, striata, nebulosa; spira tumidula, ad quartam partem sita. Boh. — Norv.
109. *L. tentaculata* MONT. — Pall. depressum, subverrucosum, fulvum, rufo pictum, plica antica media. — *T. priori* simillima, subopaca, striis evanidis. Boh.
110. *L. latens* (Bulla) MUELL., STRÖM = *Sig. Strömii* SARS. — "Pall. convexum, fuscum; plica antica media." Testa late ovali, postice obtusiuscula, spira depressa ad tertiam partem sita, striis evanidis. (SARS dd.) Bergen.
111. *L. prodita* n. — Pall. depressum, in dorso tenuissimum l. scissum, subverrucosum, rubens, fusco maculatum, plica antica sub-sinistra, et canali laterali dextro. — *T. elongata*, opaca, striis

incrementi subrudis, labro subrecto, membranaceo, spira minuta in quinta parte sita. Finm.

Capulus MONTF.

112. *C. hungaricus* L., ANGL., (*Pileopsis*) LAMK. — *Ommatophori liberi*, producti; rostrum productum, labiis in canalem longum, hamatum exsertis. Boh. — Norv. bor.

Cypræa L.

113. *C. europæa* MONT. = *C. coccinella* LAMK. = *C. norvegica* SARS. — Apud nos var. *arctica* MONT., unicolor, rubicunda, immaculata, sulcis continue superductis, sola occurrit. Boh. — Trondhj.

Aporrhais (ALDROV.) DAC.

114. *A. pes pelicani* (Strombus) L., (*Tritonium*) MUELL., (*Rostellaria*) LAMK., (*Chenopus*) PHIL. = *A. quadrifidus* DAC. Kull. — Bergen.

Scalaria LAMK.

Animal proboscide longa recondenda præditum. Lingua fere qualis in Bullis, uncinis utrinque pluriseriatis.

115. *S. grönlandica* (Turbo) CHEMN., MÖLL., GOULD. = *S. planicosta* KIEN. t. 7 f. 21, = *S. subulata* COUTH. Bergen. — Finm.
 116. *S. Turtonis* TURT. Boh. — Bergen.
 117. *S. clathrus* (Turbo) L., = F. S. ed. I, 1325, S. N. ed. 10, 549 (excl. syn. GUALT.), (nec M. L. U. 352, neque S. N. ed. 12, ubi variæ subsumtæ species, etiam *S. grönlandica*, ut e patria, "O. islandico" et verbis: "mediante carinula" colligere licet.) = *S. communis* LAMK., PHIL. Boh. — Norv.
 118. *S. Trevellyana* LEACH, JOHNST., THORPE. Boh.

Actis n. g.

Animal gracile; caput non rostratum; vibracula gracilia, cylindrica, apice subinflata, basi approximata; oculi eorum basi immersi, sublaterales; proboscis longa valida, recondenda; (lingua inermis?); mentum subliberum, solea angustius, productum; lobus operculigerus amplius utrinque forma diversus, dextro largior, tri- l. quadriplicatus, sinistro in lobum unicum rotundatum, postice plicatum productus; solea linguiformis, antice truncata; operculum. — *T. turrita*, rimata; anfractus numerosi cingulis elevatis acutis obducti, apertura ovalis.

119. *A. supranitida* (Alvania) S. V. Wood, hucusque non nisi fossilis in form. Crag inventa. Boh.

***Eulima* RISSO.**

Animal proboscide longa præditum recondenda; lingua inermis? Pullum l. c. descripsi.

120. *E. subulata* (Turbo) DON., BROCCHI, RISSO, = *Melania Cambesii* PAYR. = *E. lineata* SOW. = *Mel. Donovanii* FORB. Boh. — Norv.
 121. *E. nitida* (Melania) LAMK., DESH., PHIL. Boh. — Norv.
 122. *E. distorta* (Melania) DEFR., DESH., PHIL. Boh.

***Natica* LAMK.**

Vibracula in membranam transversam connata; mentum maximum reclinatum; proboscis longa recondenda; lobus operculigerus amplissimus.

123. *N. clausa* SOW. = *N. consolidata* COUTH. = *N. septentrionalis* BECK, MÖLL.; *annon* Ner. affinis GM.? Norv. Borealis. — Finm.
 124. *N. monilifera* LAMK. = *N. collaria* LAMK. = *Ner. glaucina* L. S. N. ed. 12 ex parte (*non vero* F. S.), MONT., FLMG. = *Cochlea catena* DAC., (*Natica*) WOOD. Boh.
 125. *N. pulchella* RISSO sec. spec. Mus. Paris. auth. = *Cochlea* n. 1324 L. F. S. ed. 1 (*non* *Ner. glaucina* L. quæ sola S. N. ed. 10 nititur, sed (perdito ut videtur specimine) sub hac specie in F. S. ed. 2 ("olim ad me delata") et S. N. ed. 12 una cum priore et aliis subsumpta). = *C. catena* jun. DAC. = *N. glaucina* jun. MONT., var. β TURT. = *N. intermedia* PHIL. = *N. Alderi* FORB. = *N. similis* KOCH = *N. anglica* SOW. (ms?). Boh. — Bergen.
 126. *N. grönlandica* BECK, MÖLL. = "*N. lactea* LOVÉN" PHIL. Abb. ind. et t. 1 f. 13 = *N. livida* BEAN, THORPE; *an* = *N. pusilla* SAY? Boh. — Norv.
 127. *N. Montagui* FORB. = *N. rutila* MACG. =? *Ner. rufa* MONT. Boh. — Bergen.
 128. *N. helicoides* JOHNST. (1835) LYELL, JEFFR., MACG. = *N. canaliculata* GOULD = *N. cornea* MÖLL.; *an* = *N. islandica* GM.? Boh. — Finm.
 129. *N. aperta* n. — A. congeneribus forma testæ recedens, Sigaretum fere referens, *N. flavæ* GOULD affinis, testa rimata, tenui, pellucida, ovato-globosa; anfr. 4, ultimo maximo, inflato; spira brevis, obtusa; apertura ampla, longitudinalis, ovata, postice emarginata anfractu penultimo; lamina columellaris tenuissima, supra umbilicum omnino tectum incrassata, effusa, revoluta, deinde sensim angustata, producta, et in labrum continuata, acutum, tenuissimum, arcuatum; operculum ignotum; $\frac{13}{11}^5$ mm. Finm.

Stylifer BROD.

130. *S. Turtonii* BROD. = *Phasian. stylifera* TURT., (Velutina) FLMG.,
(*Stylina* FLMG.) MACG. Boh. — NORV.

Turbonilla LEACH.

Animal robustum, depressum Caput latum. Tentacula auriformia, extus antice canaliculata, lamina posteriore in cervice magis minusve producta, anteriore tenui, cum opposita ante oculos sæpius connata; in angulo apicali munita lobo discreto orbiculari egregie vibrante. Oculi inter bases vibraculorum sat magni, immersi, ommatophoris nullis. Proboscis sub basi vibraculorum recondenda, involvenda; evoluta cervicem latitudine vix cedens, longitudine pedem æquans l. superans, teres, versus apicem sensim attenuata, ore apicali minuto, (edentulo?). Mentum elevatum, a solea discretum, facie superna latiore, suffulcro angustiore soleæ adnatum, antrorsum declive, soleæ marginem anticum vix attingens, antice latius, rotundatum l. bilobum, læte vibrans. Solea lata depressa, antice truncata, acutangula, emarginata l. fissa, vibrans, medio angusta, postice linguiformis. Lobus operculigerus discretus mediocris, utrinque appendice conica minuta auctus. Processus pallii dexter canaliculatus, tenuis, linguiformis.

Testa rimata, subulata l. ovata, costata l. striata l. lævigata, anfractibus primariis heterostrophis, sinistrorsis, columella verticali postice plica prædita jam dentiformi, jam fere evanida. Operculum aperturæ congruum, semicordatum, vix spiratum, nucleo marginali, antico, striis incrementi imbricatis longitudinalibus, margine columellari subrecto et medio sæpius propter plicam angulato-impresso, impressione per lineam usque ad nucleum productam distinguenda.

α) Columella edentula.

*) Subulatæ, *Turbonillæ* LEACH propr., *Chemnitzæ* D'ORB.

131. *T. rufa* (Chemn.) PHIL. — *T. aciculata*, rufa, fascia fusca, anfr. regularibus dextrorsis 11, convexo-planis, costis 20 rectis, striisque spiralibus 6 sculptis intercostalibus, apert. $\frac{1}{3}$ tot. testæ vix æquante; $\frac{1}{1.7}$ mm. Boh.
132. *T. interrupta* (*Turritella*) TOTI. — *T. subulata*, rufa, obsolete fasciata, anfract. 8 parum convexis, costis 30 rectis, striis intercostalibus 12—14, apertura $\frac{1}{4}$ t. t. æquante; $\frac{1}{2}$ mm. Boh.
133. *T. Scillæ* (*Melania*) "SCACCHI" (*Eulima*) PHIL. = *Eul. Mac Andrei* FORB. — *T. subulata*, nitida, alba, anfract. 10 planis, lævigatis, apert. $\frac{1}{5}$ t. t. æquante; $\frac{6.8}{2}$ mm. Boh.
134. *T. producta* (*Jaminia*) ADAMS. — *T. aciculata*, nitida, cornea, albida, anfract. 8 parum convexis, lævibus, spiraliter subtilissime striatis, plica columellari quam in præcedentibus distinctiore, apert. $\frac{1}{5}$ t. t.; $\frac{3.9}{6}$ mm. (ØRSTED dd.) Kullen.
135. *T. clavula* n. — *T. truncato-subulata*, tenuis, nitidula, albida, apice obtusa; anfract. 5 convexis, rotundatis, glabris, su-

tura profunda; apert. $\frac{1}{3}$ t. t., colum. subarcuata, recedens; $0,7\frac{2}{3}$ mm. Boh.

**) Ovatae, Odontostomiæ FLMG.

136. *T. obliqua* (Odontost.) ALDER. — *T. oblongo-ovata*, pellucida, anfract. 4 modice convexis, ultimo in medio lineis 4—6 tenuissimis cincto, apert. $\frac{1}{2}$ t. t., elliptica, columella arcuata, plica obsoleta; $\frac{2}{3}$ mm. (ÖRSTED dd.) Kullen.

β) Columella dente munita.

a. Fauces sulcis aratæ.

137. *T. plicata* (Turbo) MONT. = *Turbo conoideus* BROCCHI = *Vol. plicatula* DILLW. — *T. conica*, glabra, anfr. reg. 6—7 planiusculis, ultimo subcarinato; apert. $\frac{1}{3}$ t. t. æquante, ovata, plica media, valida, conspicua, dentiformi; $4\frac{1}{2}$ mm. Boh.

b. Fauces lævigatæ.

*) Costata.

138. *T. spiralis* (Turbo) MONT. = *Vol. pellucida* DILLW. — *T. obtuse conica*, tenuis, anfractibus quatuor transverse costatis, ultimo basi lævi, striis basalibus cincto, apert. $\frac{2}{3}$ t. t., plica minuta occulta; $0,1\frac{7}{8}$ mm. Boh.

**) Læves.

139. *T. albella* n. — *T. turrito-conica*, tenuis, anfr. 6 rotundatis, apertura fere $\frac{1}{3}$ t. t., ovata, vix effusa, plica parva; $1,1\frac{6}{15}$ mm.
140. *T. oscitans* n. — *T. ovato-conica*, glabra, anfr. 6 parum convexis, apertura rhomboidea, $\frac{1}{2}$ testæ fere æquante, antice effusa, columella verticali, plica parva; $2,1\frac{5}{8}$ mm. Boh.
141. *T. crassa* (Odontost.) THOMPS. — *T. ovata*, subrudis, anfr. 6 convexis, ultimo medio planiusculo, apertura elliptica, obliqua, $\frac{1}{2}$ t. t. fere æquante, columella recedente, plica parva; $3,1\frac{1}{2}$ mm. Boh.

Tylodina RAFIN.

142. *T. Duebenii* n. — Animal oblongum; caput rostro destitutum, mento præditum profunde fisso, lobis lanceolatis; vibracula auriformia; branchia dextra, et pone eam anus subtubulosus; pes validus, crassus, solea ovata. Specimen unicum examinare licuit spiritu vini servatum, cujus forma, comparata icone PHILIPPI, me monuit genus hocce Turbonillæ affine esse eadem ratione ac *Emarginula Trocho*. Neque repugnat testa ovata, depresso-conica, obsolete angulato-radiata, cujus vertex recurvus anfractus præbet fere duos heterostrophos, sinistros. Color animalis et epidermidis purpureus; $10,7\frac{1}{5}$ mm. (KOREN dd.) Norv.

Trochus L.

143. *T. zizyphinus* L., AUCT. = *T. conulus* β PHIL. — *T. conulum* L. ad nostras oras nondum vidimus. Boh. — Finm.

144. *T. millegranus* PHIL. = *T. Martini* SMITH. — Cingula in nostris 6—8. Boh. — Bergen.
145. *T. cinerarius* L., AUCT. = *T. lineatus* DAC., MAT. et RACK., BLV., = *T. litoralis* BROWN (var. conica). — Ootheca nulla; ova spargit flavida numerosa. Kull. — Finm.
146. *T. tumidus* MONT., BLV. = *T. petholathus* DILLW. non GM. = *T. nassaviensis* RECL., an CHEMN.? Boh. — Finm.

Margarita LEACH.

Animal cute reticulata; vibracula tuberculis minutissimis hispida, superne canaliculata, intus lobo minuto aucta; ommatophori discreti breves, velo connati rostrum totum tegente; pes lateribus appendicibus ornatus, quarum anterior lobiformis magna, reliquæ cirriformes; pes postice superne sulco excavatus; lobus operculigerus simplex.

147. *M. alabastrum* BECK ms. — *T. imperforata*, conica; anfr. rotundati, cingulis carinulati postice granulosis; alba, cingulis in vivo aureis; $\frac{14}{12}$ mm. Bergen. — Finm.
148. *M. cinerea* COUTH. = *M. striata* "BROD. et SOW." var. grön. MÖLL. Finm.
149. *M. undulata* SOW.; an = *T. fuscus* MUELL.? Berg. — Finm.
150. *M. helicina* (Trochus) O. FABR. = *Hel. margarita* MONT., LASK. = *M. vulgaris* SOW. = *Turbo inflatus* TORR. — Obs. *M. arctica* LEACH diversa videtur forma depressiore, "operculo testaceo." Boh. — Finm.

Scissurella D'ORB.

151. *S. crispata* FLMG. Bergen.
152. *S. angulata* n. — *T. globoso lenticularis*, spira depressa; decussata, costis utrinque confertissimis, carina angustiuscula, umbilico parvo sublecto, plica verticali, porrecta, apertura subrhomboidea, lamina columellari subrecta, angulato reflexa; $\frac{3}{4}$ mm. Finm.

Emarginula LAMK.

Animal robustum, testa tectum; caput crassum rostro valido; vibracula crassa; ommatophori discreti, ovati, subpedicellati; genitale pone vibraculum dextrum minutum, simplex, cirriforme; pes validus serie cirrorum 30—35 inæqualium, brevium cinctus; pallium amplum, limbo præditum crasso, subgranuloso, marginem testæ superante; margines fissuræ pallii in canalem inferne incompletum compressum efformati, cui adstant superne papillæ 3—4. Pes postice supra marginem solæ auctus cirro unico valido, erecto, curvo, annon lobi operculigeri rudimento.

153. *E. crassa* SOW., FORB. — Costæ posterius humiliores, remotiores; long. 41, lat. 31, altit. 17, ab apice ad marg. anticum 30,9, fissura 7,6 mm. Boh. — Bergen.

154. *E. reticulata* Sow. = Pat. fissura MUELL., MONT., PENN., LAMK. non L. ut monuit RECL., minime vero = *P. lævis* MONT.; β) elevata = *E. rosea* BELL, RECL. — Apex in omni specimine illæso recurvus spiram l. testam juvenilem præbet minutam, dextro pendulam, ex anfr. sesqui celeriter crescentibus, striis æqualibus tenuissimis sculptam, integram, fissura nulla. Boh. — Finm.

Rimula DEFR.

Cemoria LEACH; *Puncturella* LOWE; *Sipho* BROWN.

Animal præcedentis; e rima verticis porrigitur pallium in tubum majorem formatum, cum additis papillis minoribus anticis sex, posticis quatuor.

155. *R. noachina* (Patella) L. (*Fissurella*) Sow., LYELL, LAMK., (*Cemoria*) GOULD = Pat. fissurella MUELL., O. FABR., (*Cemoria*) MÖLL. = "*Cem. Flemingii* LEACH" = *Sipho striata* BROWN, RECL., = *P. apertura* WOOD non MONT. — β) elata conica, costis humilioribus = *Cem. princeps* MICH. et AD. — In utraque forma, ut in genere priore, costæ et sulci punctis minutissimis niveis, seriatis ornata; canalis internus fornicatus, alis testæ adnatus, alæ vero in junioribus sæpius obsoletæ. Varietates hujus et præcedentis analogæ. Boh. — Finm.

Triforis DESH n. v.

Subg. *Mastonia* HINDS.

Animal gracile; caput latum, breve; vibracula longa, cylindrica, gracilia, apice subclavata, basi remota, velo sinuato connexa; ommatophori brevissimi ad eorum basin; proboscis recondda (?); mentum distinctum, antice subliberum læte vibrans; lobus operculigerus simplex; sipho brevis; operculum paucispirale, nucleo fere centrali.

156. *T. adversa* (Murex) MONT., TURK. = *Cerith. perversum* LAMK., (*Terebra*) FLMG., = *Turbo reticulatus* DON., = *Mur. granulatus* "REN.", BROCCHI, = *C. tuberculare* BLV. e parte, non vero MONT.; an *Trochus perversus* L.? Boh.

Turritella LAMK.

Proboscis nulla; caput minutum latum, rostro depresso, subovali, margine papilloso; ommatophori breves, parum tumidi vibracula ferentes gracilia; pes brevis, validus, antice dilatatus, cuneatus, fissus, postice abbreviatus, lobus operculigerus simplex; canalis dextro lobo auctus; margo pallii fimbriis præditus pinnatis trium ordinum, retrorsum vergentibus; operculum margine spinosum.

157. *T. unguina* (Turbo) L. S. N., MUELL., PULT., O. FABR. = *T. terebra* L. F. S. (non S. N.), MONT., ANGL., BROCCHI, (non LAMK.) = *T. cornea* LAMK., KIEN., = *T. communis*, *T. striatula* RISSO;

an = "T. triplicata Stüb." var. KIEN.? — α) anfr. rotundatis, basi convexa; β) anfr. planiusculis, basi carinata, parum convexa. Kullen. — Bergen.

Litorina FER.

158. *L. litorea* (Turbo) L. AUCT. = *Nerita litorea* MUELL. = *T. ustulatus* LAMK. Kullen. — Vadsøe.
159. *L. rudis* (Turbo) MONT. AUCT. = *T. jugosus* MONT. = *L. rudissima* BEAN = *L. zonaria* BEAN. Kull. — Norv.
160. *L. grönlandica* MÖLL. = *Nerita litorea* O. FABR. = *T. obli-gatus* SAY = *L. rudis* GOULD. Finm.
161. *L. neritoides* L., "Ren.", PHIL., non GM., LAMK. et AUCT. = *T. petraeus* MONT. = *T. caeruleus* LAMK. etc. Kull. — Norv.
162. *L. tenebrosa* MONT. = *N. litorea* var. O. FABR. 404 = *T. vestitus* SAY. Boh. — Finm.
163. *L. saxatilis* JOHNST., MACG. Boh.
164. *L. limata* n. — *T. subtenuis*, ovata, spira elata, striis tenuis-simis dense undulata; anfr. convexi, rotundati, ultimo maximo, inflato; apert. magna, dilatata, labro acuto, incrassato; flave-scens, unicolor l. fasciata l. lineis fuscis reticulata; $\frac{13}{8}$ mm. Boh. — Finm.
165. *L. obtusata* (Turbo) L. = *Ner. litoralis* DAC., DON., PENN., MONT., FLMG., WOOD, non L., DILLW., MUELL. = *T. retusus* LAMK. BLV. = *T. neritoides* GM., LAMK., BLV., MACG. — α) *Obtusata*, angulata, fusca, reticulata = WOOD, *Nerita* 27; β) *Retusa*, ci-trina, fasciata, reticulata, DAC. t. 3 f. 13; γ) *Subglobosa*, spira gibba, sordide flava; δ) *Globosa*, subtenuis, fusca, reticulata, — species totidem potius quam varietates. Kull. — Norv.

Lacuna TURT.

Animal robustum; caput validum, rostro crasso; ommatophori bre-vissimi vibraculis adnati longis gracilibus; penis pone vibraculum dex-trum validus, compressus, crassus, longus; lobus operculigerus utrin-que ala auctus cirrum styliformem emittente; solea panduriformis. Fucivoræ, in fucis fuscis virides, in rubris roseæ. Ootheca vermi-formis, crassa, in semicirculum curvata. Pullos l. c. descripsi ope veli vibrantis natantes.

166. *L. quadrifasciata* (Turbo) MONT., TURT. — *T. ovata*, tenuis unicolor l. fasciata, spira breviuscula, anfr. ultimo subcarinato; $\frac{6.3}{8}$ mm. — *Fasciatæ* unicoloribus multo rariores. Boh.
167. *L. canalis* (Turbo) MONT., WOOD, TURT. Dict. non Z. J. nec THORPE, "labro crasso" sed potius *L. gracilior* METC. — *T. ob-longo-ovata*, tenuis, cornea, anfr. convexis, rotundatis, labro te-nui, simplici; columella latitudine varians. MONT. huic sulcum

tribuit quam in *L. vincta* latiore; in nostris variat, nec in iconē
L. vinctæ ap. MONT. tam angustus. Boh.

168. *L. albella* n. — *T. globoso-ovata*, tenera, pellucida, nitescens, albida, anfr. convexis, labro simplici, columella augusta; $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ mm. Boh.

169. *L. divaricata* (Turbo) O. FABR., MÖLL. = *T. vinctus* MONT., TURT., WOOD, GOULD. — *T. ovata*, tenuis, albida, fasciis 4 l. 5 spiralibus, mediis distantibus, anfr. convexis, labro tenui, simplici; $\frac{2}{3}$ mm. Boh. — Norv.

170. *L. labiosa* n. — *T. oblongo-ovata*, solidiuscula, albida, anfr. parum convexis, ultimo rotundato-angulato, labro reflexo, acuto, intus incrassato, callo cum lamina columellari lata confluyente; $\frac{1}{4}$ mm. Finm.

171. *L. solidula* n. — *T. oblongo-ovata*, solidula, fusca, anfr. convexis, labro patulo, acuto, callo interne incrassato, apert. antice effusa; $\frac{9}{8}, \frac{5}{8}$ mm. Bergen. — Finm.

172. *L. frigida* n. an = STRÖM N. A. Dan. III, 297, f. 21? — *T. oblongo-ovata*, tenuis, albida, anfr. convexis, ultimo leviter angulato, labro tenui simplici; $\frac{1}{8}, \frac{1}{8}$ mm. Finm.

173. *L. fasciata* (Helix) AD., MONT., MACG. Boh. — Bergen.

174. *L. Montagui* TURT. = *Hel. lacuna* MONT. = *L. neritoidea* GOULD, an = STRÖM l. c. n. 120. Boh. — Finm.

175. *L. pallidula* (Nerita) DAC. MONT. Boh. — Bergen.

Cerithium BRUG.

176. *C. reticulatum* (Strombiformis) DAC., (Murex) MONT., (Terebra) FLMG. = *M. scaber* "OLIVI," BROCCHI, (Cerith.) BLV., DESH. = *C. lima* BRUG., LAMK., PHIL. = *C. Latreillii* PAYR. — An. Rissoæ lobo operculigero utrinque subalato, cirro postico rotundato-lanceolato. Pullum l. c. descripsi. Boh. — Norv.

177. *C. metula* n. — *T. subulato-turrita*, subtenuis, alba; anfr. 15—16 fere plani, prope suturam tenuissimam, vix impressam postice submarginati, sulcis præditi transversis, angustis, parum profundis, arcuatis, in ultimo circ. 35, et cingulis obducti quatuor, quorum primum l. anticum humile, lævigatum, angustum suturam premit, secundum reliquis validius, prominens, cum tertio vix cedente paullum pone medium sito, e sulcis granulatum; quartum, in medio inter tertium et suturam situm filiforme, undulatum; basis parum convexa, lævigata, striis incrementi curvis notata; apertura, ut videtur, minuta, canali sinistrorsum curvato brevi; $\frac{1}{2}, \frac{1}{8}$ mm. Spec. mortua haud perfecta vidimus. Mur. subulatus MONT. affinis sed diversus cingulis modo binis, sutura et basi fuscis. (M. v. DUEBEN, SARS dd.). Bergen.

Rissoa FRÉM.

Animal gracile, rostro valido; lobus operculigerus cirro unico postice auctus. Ootheca capsula convexa rotundata. Pullos in actis Acad. Scient. 1839 descripsi.

178. *R. zetlandica* (Turbo) MONT., TURP., (Cyclostrema) FLMG.,
THORPE; (Rissoa) BROWN Boh.
179. *R. Beanii* HANL., THORPE. Boh.
180. *R. sculpta* PHIL., an = *T. semicostatus* MONT.? Boh.
181. *R. textilis* PHIL. Boh.
182. *R. costata* (Turbo) AD., MONT. = *R. exigua* MICH. = *R. carinata* PHIL. Boh.
183. *R. striata* (Turbo) AD., MONT. = *R. minutissima* MICH.
Boh. — Norv.
184. *R. arctica* n. — *T. conoidea*, subfusiformis, striis crebris obducta, plicis ante suturam nullis. Alba l. fulvenscens, solidula, nitidula; anfr. $5\frac{1}{2}$ modice convexi, postice breviter subplanulati et lævigati; $\frac{3}{4}$ mm. Præcedenti valde affinis, sed diversa plicis ante suturam nullis. Finm.
185. *R. vittata* (Turbo) DON., = *T. cingillus* MONT., vix = *T. graphicus* BROWN, TURP. Boh. — Bergen.
186. *R. interrupta* (Turbo) AD., MONT. Boh. — Finm.
187. *R. parva* (Turbo) DAC., MONT. = *T. costatus* LAMK. ex parte, an = *R. obscura* PHIL.? Boh. — Bergen.
188. *R. rufilabris* (Alvania) LEACH, ALDER. Boh. — Bergen.
189. *R. porifera* n. — *T. ovato-conoidea*, cornea, punctis impressis cælata. Subtenuis, pellucida, nitidula, apice rubente; spira conica; anfr. $6\frac{1}{2}$ parum convexi, læves, punctis impressis subquadratis, minutissimis regulariter seriatis cælati, in anfr. ult. majore magis conspicuis, in primis desideratis; apert. $\frac{4}{10}$ t. t. æquans, obliqua, elliptica; labium distinctum, medio obtuse angulatum, reflexum, supra rimam umbilicalem effusum; labrum arcuatum, acutum, rubens, intus leviter incrassatum, faucibus lacteo-opacis; $\frac{3}{2}$ m.m. Forma *R. rufilabris*, sed tenuior et ecostata. *R. punctura* (Turbo) MONT. diversa "anfr. rotundatis", sed specimina quæ vidi trita, in arena collecta. Kullen. — Bergen.
190. *R. membranacea* (Turbo) AD. = *Hel. labiosa* MONT. (Turbo) TURP., (Cingula) FLMG., THORPE. — *T. turrita* tenuis, apertura fere verticali hiant, columella subdentata. Forma nostra elongata, quam pro varietate describit MONT. 400. *T. rimata*, turrita, subfusiformis, nitidula, tenuis, pellucida, fusca l. cornea fusco lineata l. alba; anfr. 8—10 parum convexi, mediis interdum nonnihil rotundatioribus, aut transversim plicato-costati, aut lævigati; apert. $\frac{3}{10}$ t. t. æquans, subovata, fere verticalis; lamina

mina columellaris parum arcuata, juxta rimam umbilicalem impressa, reflexa, fere alata, et plicam fere dentiformem obtusam interne simulans, callo formatam umbilicali, inde in plagam producto lacteam, incrassatam, extus gibbam labri simplicis acuti, reflexo-patuli, antierius subeffusi; fauces sæpius macula notatæ fusca, du-l. triplici, in fasciam brevem versus labrum rufescens antice producta, columella rufa; $\frac{1}{3}, \frac{2}{5} - \frac{8}{3}$ mm. α) Lævis, alba, postice fuscescens, pellucida. β) Cornea, postice costata; *annon* = *R. similis* BROWN? *R. discrepans* BROWN? γ) Alba l. cornea, anfr. mediis convexioribus, exquisite circ. 16—costatis, anterioribus lævissimis. δ) Alba l. cornea, lineis transversis undatis fuscis picta, anfr. omnibus costatis, costis in ultimo obsoletis, dimidiatis, in dorso nullis. Boh. — Bergen.

191. *R. cornea* n. — *T. ovato-conica*, cornea, apertura obliqua, patente, columella subdentata. Priori valde affinis, sed diversa forma semper magis ovata, anfr. paucioribus, apertura magis obliqua; $\frac{4}{1}, \frac{2}{8}, \frac{5}{5}$ mm. Boh.

192. *R. albella* n. — *T. ovata*, subinflata, pellucida, lævigata, nitidula. — Anfr. 6 convexi, læves, lineis nonnullis spiralibus, parum elevatis, filiformibus cincti; apertura ovata, $\frac{2}{3}$ t. t. æquans, labio prope rimam umbilicalem leviter angulato; columella parum arcuata, recedens; labrum acutum, tenue; plaga faucium incrassata, alba, extus gibba; $\frac{3}{1}, \frac{7}{7}$ mm. α) Alba, glaucescens unicolor l. maculis transversis ante suturam, fascia basali et labro rufis. β) Cornea, pictura saturatiore, lineis spiralibus obsoletis. Utraque var. aut tota lævis aut plicata, plicis aut in quoque anfr. conspicuis, in ultimo vero semper dimidiatis et in ventre distinctioribus, aut in penultimo, aut in prioribus solum manifestis. Forma plicata sæpius magis rotundata, *R. Ehrenbergii* PHEL. interdum haud absimilis, an e *R. albella* n. lævigata et *R. parva* hybrida? Boh.

193. *R. Sarsii* n. — *T. conoideo-ovata*, tenuis, pellucida, lævigata, alba, maculis juxta suturam et in basi transversis, regularibus ornata. — Anfr. 6, postici parum convexi, anteriores rotundati, striis spiralibus omnino destituti; apertura $\frac{1}{3}$ t. t. æquans parum obliqua, ovata; columella parum arcuata, labrum tenue, simplex, acutum; $\frac{3}{1}, \frac{7}{7}$ mm. — *R. semistriatæ* (Turbini) MONT. = *R. pulchræ* JOHNST. haud absimilis, sed major, ventriosior, tenuior et striis omnino destituta; a præcedente diversa magnitudine, facie omnino lævi, labro tenui. (SARS dd.) Bergen.

Paludinea PFEIFF.

194. *P. Ulvæ* (Turbo) PENN., MONT., ANGL. Kullen. — Boh.

195. *P. balthica* NILSS., *non* = *T. ulvæ* ANGL. et a *P. muriatica* LAMK. diversa forma brevior, testa aliquantum tenuior; Cing. minutæ GOULD valde affinis. Kullen. — Boh.

Skenca FLEMING.

Animal Rissoæ, lobo operculigero ala utrinque rotundata aucto, postice lanceolato-producto.

196. *S. planorbis* (Turbo) O. FABR., MÖLL. = *Hel. depressa* MONT., (Turbo) TURT., (*Skenca*) FLEMING. Boh. — Finm.

Patella L.

*) *Branchiæ laterales.*

197. *P. vulgata* L., Auct. Boh. — Nordl.
198. *P. pellucida* L., MUELL., MONT. — Obs. *P. lævis* ANGL. = *P. cærulea* MONT., ad nostra litora undique granitica desiderata. Kull. — Finm.

**) *Branchiæ cervicales.* *Acmaea* ESCH., *Lottia* GRAY, *Patelloida* Q. et G., *Tectura* AUD. et M. EDW.

199. *P. testudinalis* MUELL., O. FABR. = *P. testudinaria* MUELL., (*non* L.) = *P. tessellata* MUELL. — Var. *alba* l. *atropurpurea*. Kull. — Finm.
200. *P. virginea* MUELL. = *P. parva* DaC., DON., MONT., = *P. pulchella* FORB. — Testæ pictura duplex, reticulata et radiata. Illa sæpius evanida rufa, maculis albis hexagonis, hæc plerumque constans, excellens, rosea. Testa minutissime squamulosa. Kull. — Finm.

**) *Branchiæ externæ nullæ?*

201. *P. cæca* MUELL. = *P. candida* COUTH. = *P. cerea* MÖLL. Boh. — Finm.
202. *P. fulva* MUELL. = *P. Forbesii* SMITH. Boh. — Finm.
203. *P. rubella* O. FABR., MÖLL. Finm.

Chiton L.

*) *Limbus hispidus fasciculatus; laminæ articulares in margine limbali continuatæ, incisæ.* *Acanthochiton* LEACH, *Phacelopleura* GUILD.

204. *C. fascicularis* L., Sow. Boh. — Norv.
205. *C. crinitus* PENN., Sow. Boh. — Norv.

**) *Limbus hispidus, valvulæ (excl. lamina) sublunatæ, laminæ articulares productæ, integræ, in margine limbali nullæ.*

206. *C. Nagelfar* n. — *T. elongata*, purpurea, valvulis granulosis, 3—7 latioribus, ultima prima latiore; $\frac{4\frac{3}{4}}{2\frac{1}{2}}$ mm. — Valv., 1, 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, crassæ, rotundato-carinatæ; mediæ subreniformes, long. ad lat. = 1:2, 2, margine postico subrecto, brevimucronato, antico producto, medio emarginato-truncato; v. secunda subdeltoidea, long. ad lat. = 1:1,8; prima semiorbicularis, ultima subrhomboidea, illa latior, postice subemarginata.

Areae impressione obliqua leviter distinctæ. Granula vesiculosa, elevata, in medio minora, ovalia, passim connexa, per series moniliformes densissimas disposita, medio longitudinales, hic et illic leviter flexas, subbifidas, utrinque divergentes, in areis lateralibus irregulares, secundum strias incrementi rudes recurvas. Laminæ articulares spatio tertiam partem latitudinis fere æquante separatæ, in angulum rotundatum productæ, integræ, ad marginem limbalem nullæ; in v. prima declivis, striata, integra, in ultima postice nulla. Limbus crassus tumidus, setis brevibus, gracilibus, æqualibus dense hispidus. — Inter Europæos gigas. — Nagelfar nomen erat navis Odini unguibus hominum mortuorum contextæ, sec. myth. scandinavicam. Finm.

207. C. Hanleyi BEAN, THORPE. — T. oblonga, alba l. fuscescens, valvulis 5–6 latioribus, prima ultima majore, costato-granulosis, limbo hispido subfasciculato; $\frac{2}{3}$ mm. — Valv. 8,1,2,7,3,4,5,6, crassiusculæ, convexæ, margine postico subrecto, brevimucronato, antico arcuato medio emarginato, utrinque rotundato, long. ad lat. in v. quinta = 1:2,7, in secunda antice subangulata = 1:2,2; prima semiovalis, ultima illa angustior. Areae parum distinctæ. Granula in media v. minora, versus latera magna, inflata, papillosa, globulosa, fere pedunculata, passim decidua, præsertim in margine postico, quem tuberculosum reddunt, per aream mediam in series digesta longitudinales, medio parallelas, utrinque radiant, fere costales, sulcis discretas, in areis lateralibus secundum strias incrementi fere arcuatim ductas; in v. prima granula inæqualia concentricè disposita, ut in ultimæ parte postica. Laminæ quales in priore, sed paullum breviores et magis rotundatæ, vix angulatæ. Limbus hispidus, ad angulum posticum cujusque valvulæ setas emittens longiusculas, subfasciculatas. Boh. — Finm.

***) Limbus squamulis imbricatus; areae distinctæ, granulorum series in media longitudinalibus, in laterali utrinque transversis, radiatis; laminæ late disjunctæ, integræ, in margine limbali nullæ.

208. C. albus L., GUNN., MUELL., O. FABR., SPGLR., MONT., GOULD. = C. aselloides LOWE. — T. oblonga, carinata, alba l. fuscescens, squamulis limbi æqualibus politis; $\frac{1}{3}$ mm. Boh. — Finm.
209. C. cinereus L., MUELL., MONT., LAMK., (non O. FABR.) = C. asellus SPGLR., CHEMN., LOWE, DESH. = C. minimus CHEMN (non SPGLR.) — T. ovata, subdepressa, cinerea fusco lineata, squamulis limbi inæqualibus, rudibus; $\frac{5}{8}$ mm. Kull. — Bergen.
210. C. alveolus SARS ms. — T. oblonga, convexa, alba, squamulis limbi inæqualibus, angustis; $\frac{1}{2}$ mm. — T. satis convexa, vix culminata; valv. 8,1,7,2,3,6,4,5, arcuatæ, longæ, long. ad lat. in quinta = 1:3, postice rectæ, vix mucronatæ, margine antico leviter arcuato, medio emarginato, limbali rotundato. V. secunda antice subangulata, prima semicircularis, ultima subelliptica. Laminæ spatio separatæ $\frac{1}{3}$ tot. lat. fere superante, rotundatæ. Series granulorum in areis lateralibus transversæ, den-

sæ, fere secundum strias incrementi arcuatæ. Limbus albus, angustus, tenuis, squamis elongatis, mucronatis irregulariter imbricatus. Boh. — Bergen.

****) Limbus lævis l. granulosus; valvæ breves, distincte mucronatæ; laminæ disjunctæ, circa marginem valvæ limbalem continuatæ, fissura laterali utrinque unica; valva prima ultima major.

211. *C. ruber* L., MUELL., SPGLR. (*non* FLMG., SOW.) = *C. punctatus* STRÖM, TURT. (*non* L. S. N.) = *C. marmoreus* O. FABR. = *C. latus* LOWE, SOW. = *C. lævigatus* FLMG. = *C. fulminatus* COUTH. GOULD. — *T. oblongo-ovata*, rubra, albo varia, tenuissime granulosa, limbo cartilagineo lævi olivaceo; $\frac{30}{17}$ mm. — Hic sine dubio *Ch. ruber* L. in oceano boreali cum *Ch. cinereo* et albo frequens, quem in F. S. propter granula *C. punctato* suo *Chinensi* (S. N. ed. 10) adnumeravit, novam speciem in Fauna condere nolens.

Kull. — Finm.

212. *C. lævis* PENN. (*non* MONT., PHIL.) = *C. ruber* LOWE, FLMG., SOW., CHEMN. VIII, 288 sec. descr., GOULD = *C. minimus* SPGLR. *non* CHEMN. — *T. oblonga*, convexa, rosea albo fulvoque varia, lævis, limbo farinoso, rubro, fasciis albis; $1\frac{2}{3}$ mm. Boh. — Finm.

213. *C. marginatus* PENN., MONT., LAMK. = *C. cinereus* SPGLR., LOWE. — *T. ovata*, cinerea fusco reticulatim variegata, granulosa, limbo farinoso fusco fasciis ocellatis albis; $1\frac{1}{2}$ mm. Boh.

****) Limbus squamis aciculatis appressis tabulatus; laminæ articulares antice continuæ, incisuris utrinque tribus; valva ultima prima major.

214. *C. corallinus* RISSO, PHIL., = *C. lævis* MONT., TURT., LOWE, FLMG., PHIL., *non* PENN. — *T. coccinea*, tenuissime striata et granulata, limbo coccineo, maculis quatuor albis; $1\frac{1}{3}$ mm.

Boh. — Bergen.

Cirrobranchia.

Dentalium L.

215. *D. entalis* L. F. S. ed. 1 et 2, MONT. — *T. leviter arcuata*, alba, apice fissa. Long 52 mm., diam. apert. 5,5 mm. — *T. numquam postice rosea*. α) Postice lævissima vix corrosa, parum decollata. Norvegia. β) Striis incrementi subrudis et annulata, postice obsolete 20-angula, semper corrosa, ætate decollata, haud raro truncata = *D. labiatum* BROWN. — Pulla, modo illæsa, apicem habent leviter inflatum, cum apertura ovali, subobliqua. Postea apex corroditur et subinde decollatur. Internum vero et solidius testæ stratum, tardius solutum, ex apertura prominet concham minutam haud male simulans, velut testam intra testam. Juniores versus apicem magis arcuata, atque præsertim in abyssis 100 org., tenuiora et exquisite angulata.

Kull. — Bergen.

Brachiopoda.

Terebratula (LWYD) MUELL.

216. *T. septigera* n. — *T. lævis*, ovato-triangular, fronte truncata et leviter biplicata, apertura magna, orbiculari, deltidio sectante integro, apophysi in arcu reflexo dilatata, valvæ inferioris septo medio elevato; $\frac{2}{3}$, cr. 17 mm. — *T. alba* tenuis, subpellucida, subtilissime punctata, tumida, crassitudine maxima pone medium; margines laterales leviter arcuati, paralleli l. versus frontem conniventes, cardinales nonnihil impressi, frontalis subrectus, truncatus, cum lateralibus utrinque sub angulo obtuso conveniens; rostrum validum, parum deflexum, oblique resectum; v. sup. versus frontem leviter devexa inter sinus duos parum prominentes; v. inf. versus frontem medio paullum convexa inter depressiones duas leves, angulis subtumidis; apophysis arcum elongatum format per $\frac{3}{4}$ alt. testæ versus frontem descendentem, gracilem, ibi vero reflexum et valde dilatatum, superne iterum angustatum; septum v. inf. a cardine ad finem apophyseos et ultra extensum, extus linea opaca proditum; deltidium validum, connatum, truncato-trigonum, aperturæ quadrantem definiens. Norv. med. — Finm.
217. *T. cranium* MUELL., GM., MONT. — *T. lævis*, ovata, apertura magna, incompleta, deltidiis angustis, late separatis, apophysi prioris, sed lineari, v. inf. intus striis convexis quatuor a cardine radiantibus, quarum binæ mediæ frontem petunt; $\frac{2}{3}$, crass. 14 mm. — Margines laterales conniventes, frontalis interdum leviter truncatus; rostrum satis deflexum. Boh. — Finm.
218. *T. caput serpentis* (Anomia) L. = *A. retusa* L. = *A. pubescens* L., MUELL., = *A. aurita* GM., (*Terebratula*) FLMG., = *T. nucleus* MUELL. = *T. costata* LOWE. Boh. — Finm.
219. *T. psittacea* (Anomia) GM., AUCT. Finm.

Crania RETZ.

Orbicula CUV., LAMK., non Recent.

220. *C. anomala* (Patella) MUELL. = Pat. distorta MONT. = *Orbicula norvegica* LAMK. (non Sow. Gen. f. 3-5, nec Lin. Tr. XIII, 468 t. 26 f. 2), = *Crania personata* Sow. ib. 471 f. 3. (excl. syn. L., POLH; vix Id. Gen. f. 1, 2, non LAMK.) — Umbo submarginalis, numquam medius. Boh. — Norv.

Acephala.

Cfr. Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. 1844, 52 t. 1 f. 9-11.

Anomia L.

221. *A. striata* BROCCHI, PHIL. = *A. undulata* TURT. (non GM., MONT.), an = *A. squama* GM., CHEMN.? — *T. subovata*, striis radiata

creberrimis, undulatis, imbricato-squamosis, foramine subtriangulari, umbone submarginali; $\frac{3}{3}$ mm. — Squamæ fornicatæ; t. intus fundo viridis, extus albida radiis rufis, nisi offuscata; var. magis minusve convexa. Boh. — Norv.

222. *A. patelliformis* L. N. A. Ups. 1, 42, t. 5, f. 6, 7, CHEMN. VIII, f. 699 (*non* = ib. f. 700) = *A. undulata* GM., MONT., MACG. — *T. suborbicularis*, plicis radiata 20—30 convexis, leviter flexis, striis concentricis tenuibus, crebris, sublaminaceis, foramine ovato, umbone subprominulo, acuto, a margine remotiusculo; $\frac{2}{4}$ mm. — *T. intus fundo viridis*, extus albida, fascia interstitiorum rufa. Boh. — Norv.

223. *A. aculeata* MUELL. STRÖM, MONT., TURT., GOULD. — *T. suborbicularis*, striis prædita concentricis, radiatim squamoso-aculeatis, foramine ovato, umbone submarginali lævi; $1\frac{1}{3}$ mm. — *T. sæpe longior quam alta*, striæ magis minusve crebræ, laminosæ. V. inferior interdum superiori simillima. Kullen — Norv.

224. *A. squamula* L., GM. = *A. flexuosa* GM. = *A. rugosa* GM. = *A. cylindrica* GM., *an* = *A. punctata* CHEMN., GM.? Kullen — Finm.

Ostrea L.

225. *O. edulis* L. Boh. — Tränen Nordl.

Pecten MUELL.

*) Sinus auriculæ ant. dextræ obsoletus, margine muticus.

226. *P. maximus* (*Ostrea*) L. AUCT. Boh. — Norv.

**) Sinus distinctus, margine denticulatus.

227. *P. opercularis* (*Ostrea*) L., AUCT., (*non* MUELL.) = *P. 20-sulcatus* MUELL. Kullen — Bergen.

228. *P. sulcatus* MUELL. Pr. 2995, (*non* (*Ostrea*) GM., LAMK. etc.) = *O. arata* GM. — *T. æquivalvis*, æquilatera, coccinea l. rosea, fere æque longa ac alta, margine cardinali $\frac{2}{3}$ longitudinis tot. æquante, costis radiata elevatis, inæqualibus, crebre articulatis, interstitiis subtilissime rimulosis et reticulatis striis costarum articulos connectentibus; auriculæ inæquales, anterioribus fere duplo longioribus, reticulatæ; $\frac{2}{4}$ mm. — α) Costis primariis circ. 35 modice crassis, simplicibus, secundariis singulis. — β) Costis primariis circ. 15—18, crassis, fasciculatis, superne nodulosis, inferius inflatis, fragilibus, striis porosis ornatis, secundariis binis, ternis. Boh. — Bergen.

229. *P. varius* (*Ostrea*) L. AUCT. Boh. — Bergen.

230. *P. islandicus* MUELL., AUCT. Boh. — Finm.

231. *P. distortus* DAC., (*Ostrea*) MONT., = *P. pusio* PENN., DON., Sow. (*non* L.), = *O. sinuosa* GM. (*Pecten*) TURT., THORPE, (Hin-

nites) DESH. — V. dextra rarissime libera, plerumque Cyprinae l. Oculinae adnata. Sinus non nisi deformitate clausus, profundus, angustus, margine pectinatus. Boh. — Bergen.

232. *P. septemradiatus* MUELL., (Ostrea) GM., = *P. triradiatus* MUELL. = *P. danicus* CHEMN., SOW., = *P. pseudamusium* CHEMN. (sub *O. hybrida* GM. subsumta), = *P. adpersus* LAMK., DESH. = *P. nebulosus* BROWN. — Striae jam tenuissimae, jam notabiles; plicae 5—10, saepius 7—8, rotundatae l. acutae; sinus parum profundus, vix acutus. Kullen — Bergen.
233. *P. tigrinus* MUELL., DESH. = *P. parvus* DAC. = *P. obsoletus* PENN., ANGL. = CHEMN. XI f. 2031—2036. — T. convexa, altior quam longa, solidula; plicae 3, 5 obsoletae, costellae numerosae, supra medium rarissime distinguendae; sculptura e striis subtilissimis arcuatim divergentibus, undulatis, gyrosis; auriculae posteriores anticis dimidio breviores; margo cardinalis dimid. t. longitud. vix aequans; $\frac{2.9}{28.6}$, $\frac{1.7.5}{17.3}$, $\frac{1.3.2}{12.2}$ mm. Boh. — Finn.
234. *P. furtivus* n., an = *O. laevis* MONT., MAT. et RACK.? (non PENN.) — T. parum convexa, tenuis, aequae alta ac longa; plicae nullae, costellae nullae nisi ad latera, ubi interdum 5, 6 lineares, squamosae; sculptura qualis in priore subtilissima e striis subdichotomis, flexuosis, moniliformibus; auricula posterior dimidia antica nonnihil longior; margo cardinalis dimidiam longitudinem testae superans; pictura mire variabilis; $\frac{1.8}{18}$, $\frac{1.7.3}{17.3}$, $\frac{1.4.6}{13}$, $\frac{1.2.4}{11.4}$ mm. — Species pro juniore praeced. male habita, tenuior, rotundatior. Juniores in hoc genere adultis elongatiores. Boh. — Bergen.
235. *P. striatus* MUELL. = *O. fuci* GM., = *O. vitrea* β GM., CHEMN. VII, f. 637 b, c, = *P. aculeatus* JEFFR., SOW., = *P. rimulosus* PHIL. — T. inaequalvis; auricula posterior antica dimidia vix brevior; radii circ. 70 squamis muricati minutis fornicatis; $\frac{2.1}{20.1}$ mm. Kullen — Finn.
236. *P. vitreus* (Pallium) CHEMN. (Ostrea) GM., (non Risso, non Sow.) — T. tenuissima, alba, orbicularis, tumidula, subaequilatera, postice plenior, rimulis linearibus interruptis subtilissime radiatim caelata, striis concentricis ornata capillaceis, crebre squamiferis, squamis minutis, fornicatis, inferne resectis; marg. card. = $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{8}$ long. t.; auriculae posticae angustae, obtusangulae, a disco levius distinctae, = $\frac{5}{7}$ l. $\frac{3}{4}$ anteriorum, quarum sinistra subrectangula; sinus profundus acutus. Var. laevigata, squamis ad latera solum obviis; $\frac{11.4}{11.8}$ mm. Boh. — Finn.

***) Sinus distinctus, margine muticus.

237. *P. imbrifer* n. — T. tenuissima, fragilis, alba, inaequalvis, v. sin. majore, aequae alta ac longa, subaequilatera, antice levius producta, parum convexa, striis notata concentricis, imbricatis, crebris, in v. d. simplicibus, in v. s. squamatis, squamis per radios circ. 28 inaequales dispositis, vesicularibus, oblongis, spinulis muricatis, versus marginem sensim auctis; margo cardin.

- dimid. t. longit. superans; auriculæ posticæ acutangulæ, anticæ duplo majores, obtusangulæ, sinu profundo, acuto; $\frac{10}{16}$ mm. Finm.
238. *P. tumidus* TURT., MACG., SOW. = *P. pygmæus* "MUEST.", PHIL.
Bergen — Finm.
239. *P. groenlandicus* SOW. = *P. vitreus* GRAY. — *T. tenuissima*, hyalina, planulata, alba, undique glabra, æquivalvis, sub-æquilatera, antice producta, vix longior quam alta; margo card. = $\frac{2}{3}$ long.; auriculæ subæquales, obtusangulæ, præsertim sinistra anterior, dextra longiore, rotundata; sinus brevissimus, acutus; $\frac{2\frac{5}{8}}{2\frac{5}{8}}$ mm. Finm.

Lima BRUG.

*) Testa inæquilatera.

240. *L. excavata* (Ostrea) J. C. FABR. Boh. — Norv.
241. *L. hians* (Ostrea) GM., SCHRÖT., = *L. tenera* TURT., PHIL. (jun.)
= *L. oblonga* S. V. WOOD. = *L. Sarsii* KRÖY. = "L. inflata Lam.?" FORB. = *L. aperta* SOW. Norv. med.
242. *L. Loscombii* "LEACH," SOW. = *L. bullata* TURT., PHIL., (non CHEMN.) = *L. fragilis* MONT., (an WOOD?) Boh. — Bergen.

**) Testa æquilatera; *Limatula* S. V. WOOD.

243. *L. subauriculata* (Pecten) MONT., TURT., WOOD, SOW., (an PHIL.?) — *T. cordato-inflata*, ovalis, altit. ad long. fere ut 8:5, cardine in adultis = $\frac{1}{3}$, in junioribus $\frac{2}{3}$ altit.; costellæ tenues, mediis binis retrorsum nonnihil vergentibus; $\frac{12\frac{8}{8}}{8\frac{8}{8}}$ mm. Boh. — Bergen.
244. *L. sulculus* LEACH. = "L. sulcata LEACH", MÖLL. — *T. oblonga*, subspathulata, altit. ad long. = 9:5, cardine $\frac{1}{3}$ altit. vix æquante; costellæ acutæ, mediis binis verticalibus; $\frac{4\frac{8}{8}}{2\frac{1}{9}}$ mm. Bergen — Finm.

Limea BRONN sec. PHIL.

245. *L. Sarsii* n. — *T. subglobosa*, rotundato-ovata, subæquilatera, undique clausa, costis dense radiata rotundatis, elevatis, imbricato-squamosis e laminis concentricis superductis; margo cardinalis vix obliquus, omnino rectus, denticulis utrinque circ. 15, fovea ligamenti trigona, area vix concava, longitudinaliter striata; umbones prominuli; margo crenatus; costæ utrinque obsoletæ, mediis circ. decem validis; $\frac{5\frac{5}{4}}{1\frac{1}{1}}$, crass. 3,7 mm. — Pallium cirris destitutum; versus Limopsin transitus. (SARS dd.) Bergen.

Crenella BROWN.

246. *C. decussata* (Mytilus) MONT., LASK., MACG. = *C. elliptica* BROWN. = Mod.? *cicercula* MÖLL. — A *Modiola faba* O. FABR. et *M. glandula* TORR. æque diversa. Boh. — Finm.

Modiolaria BECK.

247. *M. discors* (Mytilus) L.: "T. ovali cornea subdiaphana antice longitudinaliter, postice transversaliter striata; . . magnitudine fabæ . . marginibus virescentibus . . Hab. in Norvegia et Islandia". = *M. discrepans* MONT. 169 = *M. discors* β MAT. et RACK. — "M. discors collectionis Linneanæ teste FORBESIO est *M. discrepans* MONT." ALDER in litt. Boh. — Norv.
248. *M. lævigata* (Modiola) GRAY App. Parr. Voy. 245 (excl. var. β , quæ fortasse = *M. discrepans* GOULD) = *M. discors* O. FABR., SOW., BECK, MÖLL., = Chemn. VIII f. 764 a, b. Finm.
249. *M. nigra* (Modiola) GRAY l. c. = *M. discrepans* MONT. Suppl. 65, t. 26 f. 4, LEACH App. Ross 176, SOW., = SCHRÖT. Einl. III, t. 9 f. 15, = CHEMN. VIII f. 766, 767; an = *M. nexa* GOULD? — Juniores olivaceæ. Kullen — Norv.
250. *M. marmorata* (Modiola) FORB. = *M. discors* DAC., MONT., TURT., ANGL. (non GOULD), = *M. discrepans* LAMK. (non PHIL.), = "M. europæa D'ORB." Mus. Par. Boh. — Bergen.

Modiola LAMK.

251. *M. vulgaris* FLMG. = List. Con. t. 1057, f. 5 = Myt. modiolus MONT., DON., = *M. barbatus* L. F. S.; an = *M. grandis* PHIL.? — *M. modiolus* L., secundum S. N. ed. 10 et M. L. U. definiendus, videtur = *M. Tulipa* LAMK., PHIL. Kullen — Finm.

Mytilus L.

252. *M. edulis* L. AUCT. Kullen — Finm.

Arca L.

253. *A. navicularis* BRUG., DESH., PHIL. — *A. tetragona* LAMK. (non BLV.); annon = *A. Noë* MUELL.? — Specimina nostra mediterranea potius quam *A. britannicam* REEVE referunt. Boh. — Bergen.
254. *A. nodulosa* MUELL., CHEMN. VII, 201, (non BROCCHI), = *A. lactea* β GM.; annon = "A. scabra POLI" PHIL.? — T. oblonga, antice abbreviata, subangulata, postice producta, latior, obtusangula et margine dorsali compressa, striis radiantibus et longitudinalibus decussatis nodulosa; $\frac{7}{13} \frac{4}{8}$ mm. — Umbones in $\frac{1}{4}$ anter. siti; aræa angusta, octies l. novies longior quam lata; noduli postice fere squamiformes, majores; striæ longitudinales antice crassiores; sinus impressus ab umbone ad marginem ventralem medium, pone quem testa tumidior; cardinis linea utrinque subarcuata, dentibus rugulosis antice quinque, postice decem; testa alba, epidermis fusca, lacera. Var. postice angustior, et angulo fere acuto antice terminata, sculptura omnino eadem, = *A. aspera* PHIL. — *A. lactea* L., MONT., PHIL., differt umbonibus

fere ad $\frac{1}{3}$ sitis, sculptura subreticulata, latere antico non angustiore. Norv.

255. *A. pectunculoides* "SCACCHI," PHIL. Bergen — Finm.

Nucula LAMK.

Siphones nulli; pes securiformis, brevis, solea plicatili margine ciliato-crenata; "palpi" magni, lati, ad basin postice appendice præditi. Testa subtrigona, antice productior, dentium cardinis majore parte ante foveam ligamenti cochlearem, antrorsum vergentem, verticalem.

256. *N. sulcata* "BRONN," PHIL. Boh.

257. *N. nucleus* (Arca) L., MONT., TURT. = *Glycymeris argentea* DAC. — β) *Luteola*, læviuscula. Kullen — Bergen.

258. *N. nitida* Sow. Boh.

259. *N. tenuis* MONT., GOULD, (an MÖLLER? — specim. grönl. ambitu angulato-trapezoidea, margine dorsali producto, compresso.) — β) Major, subtriangula, margine dorsali vix compresso, e Fretto sundico (ÖRSTED), an propria species? Boh.

Leda SCHUM. (1817)

Lembulus "LEACH," RISSO.

Siphones distincti; pes elongatus, subclavatus, solea plicatili, margine crenulata; "palpi" elongati, externi majores, apice in cirrum producti, ad basin appendice filiformi valido aucti. Testa postice longior, rostrata, dentium majore numero pone foveam ligamenti deltoideam, demissam, retrorsum obliquam.

260. *L. pernula* (Arca) MUELL. Besch. Berl. naturf. Fr. IV, 57 (1779) = *A. rostrata* GM. (*Nucula*) LAMK., MACC., (non MONT., BROWN, quæ = *N. Montagui* GRAY), = *N. fluviatilis* Sow. — α) Major, tumida, interdum abbreviata, epidermide viridi, *N. Jacksonii* GOULD affinis, *L. buccatæ* STENSTR. fere analoga. — β) Minor, modice convexa, sæpius graciliuscula, epidermide olivacea, an = *N. oblonga* BROWN?, annon = *N. tenuisulcata* COUTH?, *L. macilentæ* STENSTR. analoga. Kull. — Finm.

261. *L. caudata* DON. = *Arca minuta* MONT., (*Nucula*) TURT., (non O. FABR., non S. V. WOOD) — α) *Ventricosa*, subabbreviata, *N. minutæ* O. FABR. analoga, (Boh. — Finm.) — β) *Compressa* = *L. intermedia* ÖRST., *L. complanatæ* MÖLL. analoga, (Boh.). — Observandum enim *Ledas* grönlandicas nostrates reddere forma quidem magis compacta et ventricosa, sed tamen analoga, eo ut varietates dices potius quam species. Boh. — Finm.

Yoldia MÖLL.

262. *Y. lucida* n. — *T. oblonga*, tenuis, alba, nitida, modice convexa, anticè elliptico-rotundata, postice producta, subtruncata, fere rectangula, compressa; margo dorsalis leviter convexus, ven-

tralis parum arcuatus; fossa ligamenti minuta, lata, demissa; umbones paullum ante medium siti, parvi, parum prominuli; dentes antici 11, postici 12, validi, curvi; $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{2}$ mm. — *N. navi-*
cularis GOULD diversa margine ventrali magis arcuato, umboni-

- bus prominulis, fossa ligamenti cochleariformi. Boh. — Finm.
263. *Y. pygmæa* MUENST., WOOD, PHIL. = "*N. pectunculoides* SMITH"
sec. WOOD = *N. lenticula* MÖLL. Boh. — Finm.

Cardium L.

264. *C. norvegicum* SPENGL. = *C. lævigatum* PENN., MONT., TURT.,
MACG., BROWN, (*non* L., *nec* CHEMN., *nec* LAMK.) = *C. serratum*
LAMK., DESH., THORPE (*non* L., CHEMN., *nec* BRUG.) = "*C. Pen-*
nanti BECK," REEVE. — *T. ovato-trigona*, umbonibus parvis, co-
stis radiata circ. 30 obsoletis, utrinque lævigata, margine in-
tus crenulato. — α) Aequè alta ac longa, obliqua, subtrigona,
postice subrecta, margine antico medio et ventrali parum arcu-
atis, epidermide sæpius violacea, pictura obsoleta, postice rufa,
maculosa; $\frac{5 \cdot 4}{3 \cdot 4}$, crass. 31; $\frac{4 \cdot 5}{3 \cdot 5}$, crass. 26; $\frac{2 \cdot 8}{2 \cdot 5}$ crass. 16 mm.
= "*C. Pennanti* BECK", REEVE; *annon* jun. = *C. serratum*
TURT. = *C. lævigatum* THORPE? — β) Longior quam alta, sub-
ovata, parum obliqua, sub epidermide flava rufo nubilosa l. macu-
lata; $\frac{4 \cdot 3}{3 \cdot 4}$, crass. 27; $\frac{2 \cdot 8}{3 \cdot 6}$, crass. 15; $\frac{1 \cdot 0 \cdot 9}{1 \cdot 1 \cdot 4}$, crass. 5,8 mm. = *C.*
norvegicum SPENGL. = *C. lævigatum* jun. MONT. — γ) Altior
quam longa, subovata, parum obliqua, ventricosa, costis admo-
dum obsoletis, epidermide olivaceofusca, pellucetibus flammulis
rufis; $\frac{6 \cdot 0}{8 \cdot 8}$, crass. 40 mm. Boh. — Norv.
265. *C. echinatum* L. Kullen — Norv.
266. *C. edule* L. Kullen — Finm.
267. *C. fasciatum* "MONT.," REEVE 118, (*non* MONT.) = *C. exi-*
guum "GM.," MACG. (*non* GM., *non* MONT., *non* PHIL.); *annon*
= *C. elongatum* "MONT." TURT., (*via* MONT.) — *T. subcordata*,
obliqua, ventricosa, costis 25 parum convexis, anticis plicatis,
posticis muricatis, mediis lævigatis planiusculis; $\frac{1 \cdot 1}{1 \cdot 1 \cdot 3}$, $\frac{1 \cdot 0 \cdot 5}{1 \cdot 1 \cdot 5}$ mm.
— *T. alba*, dorso rosea, fasciis rufis concentricis, postice læti-
oribus, antice rotundata, postice obtuse angulata et inferne
producta; inflata, postice impresso-planulata; costæ parum con-
vexæ; anticæ 1—10 plicis præditæ semilunatis, appressis, an-
gustis, inferius imbricatis, angulatis, costarum latitudinem fere
totam occupantibus, in costis 8—10 sensim rarioribus; mediæ
11—16 planiusculæ, sæpius lævissimæ, raro inferne tuberculis
nonnullis minutis præditæ; posteriores 17—25 convexæ, fere
carinatæ, muricatæ squamis compressis minutis obliquis, lineam
mediam modo occupantibus, primum minutis, raris, dein majo-
ribus, confertis, erectis, acuminatis; interstitia angustissima. an-
tice et postice impresso-punctata, medio capillacea, sæpius læ-
via. Var. costis fere lævigatis. — *Cardia europæa* misere con-
fusa. *C. fasciatum* MONT. (= *C. edule* jun. sec. Sow.) "subor-

biculare, costis antice et interdum prope marginem ventralem tuberculatis", et sec. fig. postice rotundatum. Icon a REEVE data descriptioni MONT. parum congrua; testa longior etiam quam nostra. C. exiguum MONT. (non PHIL.) subtriangulare, costis viginti tuberculatis. C. ovale Sow. ("= C. elongatum MONT.") forma quadrat, sed costas habet "anticas obscure subtilissime muricatas"; costas dat MONT. 21, TURT. 25. Boh. — Finm.

268. C. nodosum MONT., TURT. — T. ovato-orbicularis, parum convexa, æquilatera, postice truncata, costis 26 tuberculatis; $\frac{7}{8}, \frac{5}{3}$ mm. — Umbones medii, tubercula antice elongata, medio ovalia l. teretia, postice acuminata; interstitia punctato-rugosa.

Boh. — Finm.

269. C. suecicum REEVE 132 ("Suediense" — lapsus calami) = C. Lovéni THOMPS. — T. cordato-orbicularis, obliqua, tumida, alba, costis 30 dense squamosis; $\frac{11}{12}, \frac{3}{2}$ mm. — T. leviter margaritacea; squamæ laminares utrinque crebriores; interstitia utrinque profundiora, striata.

Boh. — Finm.

270. C. parvum PHIL.? (non Sow., quod prius descr.) — T. oblique cordata, convexa, costis 21 parum elevatis, anticis tuberculis, interstitiis punctatis; $\frac{6}{7}, \frac{8}{8}$ mm. — Unicum spec. ad ins. Koster prof. 70 org. inveni. Costæ mediæ subplanulatæ, anticæ tres tuberculis teretibus præditæ; interstitia utrinque profundiora, punctis impressis striata, medio minus conspicuis. Forma cum specim. a PHIL. communicatis convenit, sed costarum numero et epidermide laxiore, rugosa differt.

Boh.

Isocardia LAMK.

271. I. cor (Chama) L.

Boh.

Astarte Sow.

Species nostræ admodum variabiles usque ad deformitatem, varium convexitate, plicarum numero, latere postico obtusato, retuso, exfoliato, margine incrassato, cardine luxuriante. — Impressio ab umbonibus ad medium marginem posticum decurrens sinum efficit etsi levissimum. — Venus borealis L. non hujus generis; vide ad Lucinam infra.

272. A. danmoniensis (Venus) MONT., (Crassina) LAMK., DESH., BROWN, THORPE, (Astarte) Sow., FLNG., MACG. = Cr. sulcata TURT., PHIL., (non (Venus) MONT.) = CHEMN. VII, f. 413. — T. rotundato-cordata, postice obtusa, solida, subæquilatera, plicis 22 — 30, margine crasso, intus crenulato, epidermide castanea; $\frac{21}{24}, \frac{5}{4}$, crass. 11,2; $\frac{18}{22}, \frac{8}{2}$, crass. 11,5; $\frac{1}{8}$, cr. 7,3; $\frac{13}{13}, \frac{8}{3}$, cr. 6,5 mm. — Pullos margine crenulato non vidi. Kull. — Finm.

273. A. scotica (Venus) MAT. et RACK., MONT., LAMK., DESH., (Astarte) FLNG., MACG., THORPE f. 107 (s. n. A. ellipticæ), (Crassina)

TURT., BROWN. — T. ovato-cordata, postice truncata, subæquilatera, plicis 20–28, margine tenui, intus lævi, epidermide castanea; $\frac{19}{21}$, cr. 8,5; $\frac{17.5}{20}$, cr. 9; $\frac{14.2}{17.1}$, cr. 6,9; $\frac{13.5}{15.2}$, cr. 5,3; $\frac{10.9}{12.8}$ cr. 5; $\frac{7.2}{8.3}$, cr. 3 mm. — Var. rarius margine incrassato, sed semper lævi. Præcedenti nimium affinis, sed distincta latere postico latius truncato et, una cum ventrali, magis compresso, margine lævigato, tenui, et colore nonnihil lætiore. Utraque lunulam præbet ovato-lanceolatam satis cavam, aream duplo longiorem et ligamentum breve gracile, areæ $\frac{1}{3}$ nonnihil superans. Color intus rubens, rarius albus. Boh. — Norv.

274. *A. semisulcata* (Crassina) LEACH, MÖLL., (an JEFFR.?) = *A. gairensis* NICHOL., = *C. ovata* BROWN., = *C. elliptica* BROWN., = *C. sulcata* NILSS. (non MONT.) — T. elliptica, inæquilatera, plicis 20–25, margine lævigato, epidermide viridifusca; $\frac{23}{23}$, cr. 11,3; $\frac{16.5}{16.5}$ cr. 7; $\frac{12.5}{15.5}$ cr. 4,6 mm. — T. compressa, postice longior; umbones in $\frac{1}{3}$ antica siti; lunula ovato-lanceolata, sat profunda; area duplo fere longior, lanceolata; ligamentum validiusculum $\frac{3}{8}$ areæ long. æquans; margo lunularis modice sinuatus, arealis dimidio fere longior, rectus; anticus rotundatus, posticus truncatus, ventralis arcuatus; plicæ rotundatæ, concentrice tenue striatæ, antice et præsertim postice evanidæ, in adultis ad marginem ventralem sæpe obsoletæ. Color viridifuscus, in umbonibus fulvenscens, radiis nonnullis fuscis obsoletis; intus albus. Var. magis minusve convexa, margine interdum incrassato, numquam crenulato. Boh. — Finm.

275. *A. corrugata* (Crassina) BROWN., = *A. cyprinoides* DUV., WOODHANL., = *C. borealis* NILSS., PHIL. Abbild. (non L.) = CHEMN. VII, 412. — T. cordato-trigona, inæquilatera, postice longior, concentrice obsolete plicata, epidermide fibroso-striata, fusca; $\frac{3.5}{4.1}$, cr. 17; $\frac{3.2}{3.6}$, cr. 19; $\frac{2.5}{2.9}$ cr. 12 mm. — T. jam ventricosa, jam subcompressa, solida; umbones ad $\frac{1}{3}$ anter. siti; lunula obovata l. lanceolata, profunde excavata, obscure fusca; area lanceolata impressa, ligamento valido prominulo duplo longior; margo arealis longus, subrectus, in posticum fere absque angulo continuatus; anticus postico amplior; plicæ superne distinguendæ, at obsoletæ, inferne evanidæ; epidermis in umbonibus tenuis, dein crassa, striata, striis fibroso-lamellosis, subsericis, ad marginem creberrimis; testa crassa, fere ponderosa; limbus internus a margine ad impressionem pallii consolidatus, planus.

Finm.

276. *A. striata* (Nicania) LEACH 1819, MÖLL., (non SOW. 1822), (Crassina) GRAY, WOODHANL., NILSS., BROWN., = *C. compressa* TURT. (non MONT.), = *A. multicostata* "SMITH", MACG., PHIL. = *A. pulchella* JON., PHIL. — T. rotundato-trigona, subæquilatera, plicis linearibus regularibus 50 et ultra, epidermide luteo-fusca; $\frac{13}{14.4}$, cr. 7; $\frac{11.7}{13}$, cr. 5; $\frac{7.2}{8.5}$, cr. 4 mm. — Var. inter formam rotundatam et trigonam, interdum elongata, sæpe deformis, incrassata, postice obtusa, aut compressa, aut ventricosa. Lu-

nula oblonga, parum profunda, $\frac{5}{8}$ areæ æquans; ligamentum = $\frac{4}{9}$ areæ; margo arealis subarcuatus, lunularis leviter sinuatus; margo anticus ample rotundatus, posticus vix truncatus, ventralis arcuatus; plicæ sæpius omnes tenues, sed interdum in fascias latiores collectæ. Kullen — Finm.

277. *A. Banksii* (Nicania) LEACH, (Crassina) GRAY, WOODHALL. — T. rotundato-trigona, subæquilatera, concentrice dense striata, epidermide luteo-olivacea; $\frac{17}{18}$, cr. 9; $\frac{10.2}{11.5}$, cr. 5; $\frac{8}{9.5}$, cr. 4,4 mm. — Præcedenti affinis sed rarius deformis, jam ventricosa, jam subcompressa, sæpe nonnihil obliqua; lunula et area prioris; margo lunularis modice sinuatus, arealis subrectus, posticus subtruncatus, ventralis postice haud raro subrectus, antice in marginem anticum ample arcuatus. Testa postice levissime plicata, nitidula, striis subtilibus densis, irregularibus. — V. compressa MONT. differt ambitu fere lentiformi, margine intus admodum plano, ut in *A. corrugata*. Boh. — Finm.

Cyprina LAMK.

278. *C. islandica* (Venus) L., AUCT., GOULD. = *Venus mercenaria* L. F. S. (non S. N.) MUELL., PENN. Kullen — Finm.

Lucina BRUG.

279. *L. borealis* (Venus) L. S. N. ed. 12, 1134 n. 143 (excl. syn. List. Angl. t. 4 f. 23, quæ Trigonellam planam DAC. repræsentat), inter "impuberes orbiculatas" enumerata, post V. exoletam "testa lentiformi, alba, angulata, ad rimam recta et quasi truncata, striis membranaceis, erectis, inæqualibus, remotissimis", DON. t. 130 (an PENN. 82?), = V. spuria GM., CHEMN. VII, f. 399 (excl. syn. LIST. et KLEIN.), DILLW. 194 = *Tellina radula* MONT. (*Lucina*) TURT., LAMK., MACG.; (an GOULD?; non PHIL.) Boh. — Finm.

280. *L. spinifera* (Venus) MONT., PHIL., (Myrtea) TURT., FLMG. Boh. — Bergen.

Axinus SOW.

Cryptodon TURT., *Ptychina* PHIL.

281. *A. flexuosus* (Tellina) MONT., DILLW., (*Cryptodon*) TURT., (*Lucina*) FLMG. (vix GOULD), (*Amphidesma*) LAMK., = *Lucina sinuata* LAMK., (*Axinus*) PHIL. = *Luc. sinuosa* THORPE. — T. ovato-orbiculari, antice subangulata, subpellucida, plicis distinctis, posteriore acuta, lunula parum profunda, cardine unidentato; $\frac{6.3}{7}$, cr. 4,2 mm. Kullen — Finm.
282. *A. Sarsii* PHIL. — T. orbicularis, antice rotundata, subproducta, subopaca, plicis exoletis, lunula vix distincta, cardine edentulo; $\frac{17.5}{17.5}$, cr. 11,5 mm. Boh. — Finm.

Artemis POLL.

283. *A. exoleta* (Venus) L., MONT., (Cytherea) LAMK., MACG., (Art.) AGASS. — Lunula ad long. t. ut 1:7,2. Boh. — Bergen.
284. *A. lincta* (Venus) PULT., (Cytherea) LAMK., (Artemis) AGASS., BROWN = *V. exoleta* β MAT. et RACK. = LIST. t. 290 f. 126. Boh.
285. *A. compta* n., an = *A. lincta* MACG.? — T. sublentiformis, non-nihil longior quam alta, tenuis, convexa; margo ligamentalis subrectus, productus, cum postico subangulatus; lunula impressa, cordata, convexa, ad long. t. ut 1:6,7; striæ tenues, parum regulares, medio appressæ, utrinque erectæ, sublamellaceæ; lamina cardinalis angusta, postice attenuata, apicem impressionis muscularis vix attingens; dens lunularis v. sin. cum cardinali angulum fere rectum formans, d. cardin. et ligamentalis approximati, hic subrectus, fossa ligamentalis angusta, linearis; d. accessorius validus; in v. d. fossa cardin. magna; $\frac{2}{3}\frac{8}{2}$, cr. 16; $\frac{2}{3}\frac{5}{2}$ cr. 13; $\frac{1}{2}\frac{9}{0.3}$, cr. 10,5 mm. — Differt ab *A. exoleta* testa magis convexa, striis tenuioribus, lunula nonnihil longiore, ab *A. lincta*, striis paullum fortioribus, ab utraque forma magis elongata, lamina cardinali angustiore, dente accessorio valido, testa tenuiore. Boh.

Venus L.

286. *V. casina* L., GM., (excl. syn. LIST.) CHEMN., SCHRÖTER, TURT., BROWN. — T. ovato-cordata; lunula depressa, convexa, cordata; margo anticus sub lunula subito productus, dein arcuatus; lamellæ circ. 40 antice confertæ, revolutæ, postice discedentes, patentes; $\frac{3}{4}\frac{6}{10}$, crass. 24 mm. Bergen — Vardøe.
287. *V. fasciata* (Pectunculus) DAC., DON., DESH., PHIL. (non GM.), = *V. paphia* MONT. (non L.), = *V. dysera* "L." BROCCI (non L.) = *V. Brogniarti* PAYR. Boh. — Bergen.
288. *V. striatula* (Pectunculus) DAC., DON., MONT., HANL. = *V. rugosa* var. A PENN. = *V. gallina* L. F. S., DILLW., TURT. (non L. S. N., CHEMN., = HANL., 16, 42; an = LIST. CON. 281, 119?); annon = *V. senilis* BROCCI, PHIL.? — α) = LIST. CON. t. 282 f. 120. — T. cordato-trigona, tumida, solida, nitidula; laminæ numerosæ, confertæ, antice et postice tenues, hic arcuatæ, illic sinuatæ, medio reclinatæ, deplanatæ, imbricatæ, rugas sæpius formantes, binis l. ternis scil. confluentibus; alba, radiata, lineolis fulminatis rufis; $\frac{2}{3}\frac{5}{9}$ cr. 15,5. — β) = *V. laminosa* TURT. (vix MONT., LASK.) = *V. sulcata* BROWN = *V. prideauxiana* "LEACH", MACG. — T. cordato-trigona, elongata, modice convexa, tenuis, subrudis; laminæ pauciores, distantes, undique tenues, foliaceæ, simplices; sordide albida, pictura obsoleta; $\frac{2}{3}\frac{1}{10}$, cr. 12,5 mm. Speciem crederes propriam, sed formæ connectentes non raræ, laminis tenuibus, simplicibus crebris, l. crassiusculis distantibus; utraque, dum junior, laminis simplicibus prædita = *V. costata* BROWN. Adulta vero est γ) arctica, pumila, postice obtusa, mo-

dice convexa, angulo dorsali valde obtuso, margine ventrali arcuato, laminis parum numerosis (18—20) medio appressis, utrinque liberis, tenuibus, postice angulato-recurvis; $\frac{10}{11,5}$, cr. 5, 2 mm. Kullen — Finm.

289. *V. ovata* PENN., MONT., LAMK., = *V. radiata* BROCCHI, PHIL., = *V. pectinula* LAMK. = *V. spadicea* "REN." NYST. Kullen — Finm.
290. *V. undata* PENN., MONT., PHIL., (*Lucina*) LAMK., TURT., BROWN, (*Cytherea*) MACG., (*Artemis*) RECL. Boh. — Finm.
291. *V. virago* n., = *V. virginea* ANGL., (*non* L.); *an* = *V. virginea* var. latere antico attenuato-elongato TURT. Biv. 156?; *an* = *V. florida* LAMK.? — T. crassiuscula, modice convexa, elliptica; umbones ad $\frac{1}{4}$ anticam siti, parvi, parum tumidi; margo dorsalis posticus modice arcuatus, angulum obsoletum præbens, pone ligamentum utrinque in carinam obtusam elevatus, cum margine ventrali sub angulo subacuto rotundato confluens; margo anterior subrectus; lunula cordato-lanceolata, vix impressa; sulci concentrici lineares, regulares, passim leviter undati, postice profundius exarati, juxta marginem ventralem crebri, irregulares. Dentes divergentes, extimis angulum rectum l. subobtusum formantibus; in valva sin. medius validus, bifidus, anticus compressus, prominulus, posticus tenuis, cultratus; in v. dextra medius et posticus bifidi, anticus compressus, cultratus. Sinus palliaris semiellipticus, lat. ad long. = 1:1,8, medium testæ non attingens; angulus acutissimus. Colore var. α) alba lineolis rufis fulguratis, in radios tres interruptos congestis; β) roseo-alba, rufo punctata, radiis quatuor angustis albis spadiceo maculatis. Lunula in utraque rufa, area ad medium ligamenti utrinque macula angulata spadicea, umbones unicolores, rosei, apicibus flavis; $\frac{47}{64}$, cr. 28; $\frac{40}{54}$, cr. 22 mm. — Forma inter *V. Deshayesii* HANL. 16,35 = CHEMN. VII, 439 a TURT. citatam, et CHEMN. VII, 443 (= *V. texturata* LAMK. etc.) a MONT. citatam fere intermedia. (SARS, KOREN dd.) Norv.
292. *V. aurea* GM, MONT., TURT., LAMK., PHIL. = *V. literata* L. F. S. (*non* S. N.) Boh. — Norv.
293. *V. pullastra* MONT., TURT., LAMK. (*Venerupis*) FLMG. Boh. — Finm.

Saxicava FL. DE BELL.

294. *S. rugosa* (*Mytilus*) L., MONT., DON., TURT., LAMK. = *Myt. pholadis* L., MUELL, (*Saxicava*) LAMK., DESH., TURT. = *Mya bys-sifera* O. FABR. = *S. distorta* "SAY," GOULD. — Cardo plerumque edentulus, nymphæ intus tumidæ. Kullen — Finm.
295. *S. arctica* (*Mya*) L., MUELL., O. FABR., (*Cardita*) BRUG., (*Hiatella* DAUD.) LAMK., (*Anatina*) TURT. (d. card. v. d. fracto?) = *Chama aculeata* STRÖM = "*Donax rhomboides* POLI" (*Saxicava*) DESH. = *S. distorta* "SAY" GOULD. — α) Antice oblique truncata,

cata, carinis spinulosis. — β) Antice subproducta, ecarinata = H. oblonga TURR. — γ) Antice retusa, sæpius ecarinata, = Myt. præcisus MONT.; an = Agina purpurea TURR.? (non (Mya) MONT.) — Cardo rarissime edentulus; v. d. dente valido cum fossa postica parum profunda, v. s. dente parvo cum fossa antica profunda, marginali, pervia. Kullen — Finn.

Tellina L.

296. *T. crassa* PENN., MONT., TURR., LAMK., (an PHIL?), (Venus) GM., "(Arcopagia) LEACH," BROWN, = *T. rigida* PULT., DON.

Boh. — Bergen.

297. *T. lata* GM. (non Q. et G.) = LIST. Con. t. 407 f. 253 (a Wood ad Trigonellam planam male citata) = "*T. triangularis* WAHLENE.", LYELL, (non GM.) = "*T. proxima* SMITH." = *T. calcarea* LYELL, HIS., MÖLLER (an GM., CHEMN. VI, f. 136?) = *T. sabulosa* SPGLR.; an = *T. sordida* COUTH? — *T. ovata*, calcarea, antice aliquantum longior et ample rotundata, postice obtuse angulata, dentibus utrinque binis, postico v. d. majore et antico v. s. bifidis, laterilibus nullis; $\frac{3}{4}$, cr. 16; $\frac{3}{4}$, cr. 10,5; $\frac{1}{2}$, cr. 7 mm. — *T. opaca*, modice convexa l. subcompressa, epidermide tenui rugulosa tecta, postice subtruncata, modice plicata; umbones in $\frac{2}{3}$ posticis siti, minuti; margo dorsalis lunularis leviter arcuatus, nonnihil elatus, ligamentalis rectus; striæ incrementi distinctæ, irregulares; lamina cardinalis subangusta; dentes v. d. basi angusti, anticus fere bilobus, posticus simplex, minutus; v. s. anticus compressus, basi constrictus, posticus minimus, acutus, fragilis; impressiones musculorum intus laceræ, extus angulato-rotundatæ, superne auctæ, inferne subtruncatæ, antica major; impressio palliaris longitudinalis, in v. d. haud parum brevior, primum breviter adscendens, dein margini dorsali antico parallela, angulum formans valde acutum, mediam testam superantem, postice linea auctum $\frac{1}{2}$ posteriores attingente; limbus internus obsolete radiato-striatus. Kullen — Finn.

298. *T. tenuis* DAC., MONT., LAMK. = *T. planata* PENN. (non L.) = *T. balaustina* DILLW., (non L.) = *T. carnaria* BORN, (non L.)

Kullen — Finn.

299. *T. solidula* PULT., MONT., LAMK., (Psammobia) TURR. = *T. rubra* DAC. = *T. zonata* DILLW. (non GM., quæ = *T. balthica* PHIL., via L.) = *T. carnaria* PENN. (non L.) — Sinus palliaris longitudinalis, oblongus. — *T. grönlandica* BECK, GOULD = *Venus fragilis* O. FABR. (*Tellina*) MÖLL., sinum habet fere eundem, sed testam magis rotundatam, laminam cardinalem validam etc. — *T. balthicam* L., aquæ parum salsæ incolam, in sinu codano nondum inventam, pro varietate degeneri haberem nisi obstaret singularis diversitas sinus palliaris, profundi, acuti, umbones petentis.

Boh. — Finn.

300. *T. pygmæa* PHIL. ms. — *T. ovato-oblonga*, tenuissime striata, postice brevissima, obtuse angulata, rubra, obsolete radiata, fasciis concentricis pallidis; $\frac{0}{4.8}$, cr. 3. — *T. donacinæ* forma haud absimilis, sed minor, tumidior, et sinu palliari minus producto, dente cardinali antico magis remoto. Boh. — Bergen.

***Psammobia* LAMK.**

301. *P. feröensis* (Tellina) GM., MONT. = *T. truncata* "L.", SPGLR. (*non* L.), = Concha n. 1337, L. F. S. ed. 1 = List. App. 32 f. 8 = *T. incarnata* L. F. S. ed. 2 (*non* S. N., quæ = *T. depressa* LAMK.) Kullen — Finm.
302. *P. vespertina* (Solen) GM., MONT., (*Psammobia*) LAMK., TURT., PHIL., = *P. florida* LAMK. = *Tellina radiata* L. F. S. ed. 2 (*non* S. N.) Boh. — Bergen.
303. *P. tellinella* LAMK. = *P. florida* TURT. (*non* LAMK.) (SARS dd.) Bergen.

***Donax* L.**

304. *D. trunculus* L. Auct. "Norv."

***Mesodesma* DESH.**

305. *M. exiguum* n. — *T. ovata*, inæquilatera, postice abbreviata, antice producta, rotundata, vix attenuata, margine ventrali et dorsali leviter arcuatis, subparallelis; albida, subrudis, leviter margaritacea, epidermide tenui ferruginea; umbones minuti, subacuti, in $\frac{1}{4}$ postica siti; cardo: v. d. dens posticus brevis, compressus, prominens, anticus longior, rotundato-rectangulus; v. s. d. posticus opposito minor, triangularis, anticus elongatus parum prominens; fovea ligamenti media, sub umbone demissa; ligamentum e maxima parte osteum, ossiculo robusto, nitido, medio constricto; impressiones musculares magnæ, simplices, impressio palliari simplex; $\frac{2}{2.9}$ mm. — Speciem grönlandicam dedit MÖLLER affinem, sed majorem, subæquilateralem, d. v. d. ant. crasso, postico minuto. — Genus fere dubium propter ligamentum osteum lineamque palliarem integram. Boh.

***Cyamium* PHIL.?**

Testa ovata, inæquilatera, æquivalvis, clausa; ligamentum externum; cardo utriusque valvæ dente lunulari et cardinali approximatis, cum laterali remoto, pone ligamentum. — Ligamentum internum vix adest.

306. *C. minutum* (Venus) O. FAER., (Lesæa) MÖLLER = *Mya purpurea* MONT. "(Montacuta) BEAN", ALDER in litt., (*Erycina*) RECL.

— *T. ovata*, subcordata, postice longior, ventricosa, tenuis, concentrice substriata, purpureo-fusca, intus nitida; umbones in $\frac{1}{4}$ ant. siti; lamina cardinalis angusta, sub umbone prominens, sinuosa; cardo v. d. fossa lunulari parum profunda, d. lunulari subtrigono, valido, fossa cardinali angusta, profunda, subtrigona, d. cardinali fere sub medio umbone sito, lunulari paulum minore, rotundato; v. sin. d. lunulari minuto, antrorsum obliquo, fossa lunulari magna, trigona, d. cardinali valido, fossa card. magna, sat profunda; dentes laterales parum prominuli, longitudinales; impressio muscularis antica duplex, superior minuta, inferior ovalis, verticalis, posterior ovalis, superne emarginata; impressio palliaris vix discernenda integra videtur. — *A. Montacuta* (Lesæa) plane diversa *Cyamio* antarctico appropinquare videtur habitu, cardinis dentibus, facie testæ interna vesiculosa, — at ligamentum internum detegere non potui. Boh. — Finm.

Montacuta TURR.

Cardo: in utraque valva processus posticus, cristam formans, ab opposito alterius valvæ sensim discedentem, cui inseritur ligamentum triangulare, postice latissimum, antice sensim angustatum, demum in foramine umbonum minuto exiens; lamina cardinalis ante foramen in dentem unicum efformata.

307. *M. tenella* n. — *T. exacte elliptica*, alba, pellucida, antice longior et aliquantum altior, umbonibus in $\frac{1}{3}$ sitis, tenuissima, fragilis, convexa, dente antico v. d. minuto, rotundato, prominulo, v. s. obsoleto, crista ligamentali parum elevata, sublongitudinali; $\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{8}$, $\frac{2}{4} \cdot \frac{8}{8}$. — Specimina anglicana *M. ferruginosæ* MONT. differunt forma magis elongata, postice nonnihil angustiore, margine dorsali et ventrali subrectis, dentibus validioribus, crista ligamenti subverticali, elevatiore. *M. oblonga* TURR. diversa videtur "dentibus omnibus erectis", *Tellimya glabra* BROWN cardinis structura. Sed cavendum ne ligamentum exsiccatum pro dente describatur. Boh.

308. *M. substriata* (Ligula) MONT., (*Montacuta*) TURR., MACG.
Boh. — Finm.

Kellia TURR.

Bornia PHIL. Poronia RECL.

Cardo: v. s. dentes cardinales bini approximati, quorum posticus sub ipso umbone situs; pone eum incipit fovea ligamenti interni angusta, obliqua, retrorsum vergens, jam (in sp. infra enumeratis) in fundo umbonis abscondita, jam (in *K. rubra* TURR., *Poronia Adansonii* RECL.) apophysi suffulta prominente, cristam formante; dens lateralis posticus elongatus, remotus; v. d. dens card. unicus magnus,

recurvus; fovea ligamenti qualis in v. s., dens lateralis tenuior, oppositum excipiens. — Pes bysso præditus.

309. *K. suborbicularis* (Mya) MONT., DILLW., (Kellia) TURT., (Erycina) RECL. = *Amphidesma physodes* LAMK. sec. RECL. — T. tumida, flavescens, fasciis albidis, striis incrementi distinctis; ligamentum dimidium dentem lateralem tegens; cardo robustiusculus, dentes rugulosi, laterali postico abrupte truncato; $\frac{8}{10}$ mm. Boh. — Bergen.

310. *K. lactea* BROWN, an = *Bornia inflata* PHIL.? — T. convexa, alba, subpellucida, nitidula, lævigata; ligamentum dimidium dentis lateralis vix attingens; cardo angustus, dentes quam in priore multo minores, fere læves, laterali postico oblique truncato; $\frac{9}{11}$ mm. Boh. — Finm.

Syndosmya RECL.

311. *S. alba* (Mactra) WOOD, RECL. = *Mactra Boysii* MONT., (Amphidesma) LAMK., TURT., BROWN, = "Erycina Renieri BRONN", PHIL. = *Tellina pellucida* BROCCI, "= T. opalina REN.", (non CHEMN., Gm. 36.) — T. solidula, subopaca, inæquilatera, postice brevior, subangulata, angulo margini ventrali propiore; fovea ligamenti majuscula, semiovalis, callò subnymphali postice abrupte constricto; dent. later. v. d. subrectanguli, acie concava, antico in angulum rotundatum elato, altiore, postico subrectilineo, remotiore; cardo inter dentium apices $\frac{1}{3}$ long. tot. testæ æquans; testa manifeste flexa, subantiquata; $\frac{15.5}{22}$, $\frac{11.3}{15.7}$ mm. — Forma valde variabilis, jam subtrigona, jam subelliptica, jam rotundato-ovata, margine dorsali postico jam subrecto, jam arcuato. Sinus palliaris aliis obsoletus, aliis sat distinctus.

Kullen — Norv.

312. *S. radiata* n. — T. fragilis, pellucida, postice brevior, rotundato-angulata, angulo submedio, marg. dorsali postico arcuato; fovea ligamenti parva, sublunata, callo subnymphali postice sensim angustato; dentes cardinales approximati; dentes laterales v. d. obtusanguli, antico vix elato, postico rectilineo, altiusculo; cardo inter dentium apices $\frac{1}{3}$ t. long. t. non attingens; $\frac{12.2}{17.2}$, $\frac{11.5}{16.5}$ mm. — T. alba, nitidula radiis binis posticis pellucidis. Boh.

313. *S. nitida* (Mya) MUELL. Prodr. n. 2963, collata descriptione MUELLERI ab O. FABR. in Nat. Selsk. Skr. IV, 2, 45 citata, et CHEMN., X, 345, (non vero *M. nitida* O. FABR. l. c. 46). — T. tenuis, pellucida, elliptica, subæquilatera, antice parum longior, rotundato-producta, postice subrostrata, apice medio, margine dorsali postico prope umbonem impresso, deinde arcuato; fovea ligamenti parva, sublunata, callo subnymphali postice abrupte constricto; dentes cardinales approximati, subparalleli, æquales; d. lat. v. d. subrectanguli, postico nonnihil remotiore obtusius-

culo, antico altiore, elato; cardo inter dentium apices $\frac{1}{4}$ t. l. t. vix excedens; $\frac{2.5}{16}$ mm. — T. subantiquata, nitida, subvitrea.

Kullen — Bergen.

314. *S. prismatica* (Ligula) MONT., (Amphidesma) LAMK., DESH., TURK. — T. tenuis, subpellucida, concentrice fasciata, oblonga, inæquilatera, antice fere duplo longior, postice subrostrata, apice margini ventrali propiore, margine dorsali postico arcuato; fovea ligamenti parva, lunata, callo postice leviter constricto; dent. lat. v. d. obtusanguli, postico remotiusculo, antico altiusculo, elato; cardo inter dentium apices $\frac{1}{4}$ t. l. t. æquans; $\frac{8}{16}$, $\frac{1.3}{14.5}$ mm.

Boh. — Bergen.

Trigonella DAC.

315. *T. plana* DAC., (Tellina) DON. = *Mactra compressa* "SOL.", PULT., MONT., (Lutraria) LAMK., BROWN., (Listera) TURK., (Amphidesma) FLMG. = *Mactra Listeri* GM., (Lutraria) MACG., = *M. piperata* GM., (Lutraria) LAMK., (Scrobicularia) PHIL. = *Mya hispanica* CHEMN. = *Mya gaditana* GM., = *M. orbiculata* SPGLR. = *Venus borealis* PENN.

Boh. — Bergen.

Mactra L.

316. *M. ponderosa* PHIL. = *M. ovalis* GOULD. Finm.


317. *M. elliptica* BROWN, MACG., THORPE. — T. antice breviuscula, rotundato-angulata, margine dorsali antico arcuatior, postice subrostrata, sinu palliari linguiformi; $\frac{2.0}{24.5}$, $\frac{1.7}{23.3}$, $\frac{1.5}{21}$ mm. — Cardo $\frac{4}{5}$ long. t. occupans; lamina cardinalis in v. s. longa, sinuosa, medio leviter prominula, deinde utrinque impressa, in v. d. medio vix prominens, lateribus altior, incrassata; fovea magna, triangularis, inæquilatera, satis obliqua, ad basin antice rectangula, margine antico verticali l. levissime retrorsum vergente; d. card. v. s. $\frac{2}{3}$ alt laminæ occupans, lobis subæqualibus, postico breviusculo, margini foveæ subparallelo, in v. d. lobus posticus erectus, fere ad basin foveæ productus; dent. lat. validi, rotundati, striati, elongati, antico denti card. parum propiore, in v. d. simplici. — Hanc s. n. *M. luteolæ* GOULDIO olim dedi, qui eam pro *M. solidissima* jun. habuit. Hæc vero differt testa nonnihil altiore, margine dorsali antico parum arcuato, sinu palliari latiore, cardine brevior, $\frac{4}{11}$ long. t. æquante, fovea majore, minus obliqua, d. card. v. s. $\frac{1}{2}$ alt. laminæ card. occupante, lobo postico abbreviato, propendente, dent. later. angulatis, antico denti card. proximo, in v. d. fine postica lamina aucto etc.

Kullen — Finm.

318. *M. subtruncata* (Trigonella) DAC., (Mactra) MONT., ANGL. = *M. stultorum* PENN., (non L.) = *M. limbata* MENKE; non *M. deltoidea* LAMK.

Boh. — Norv. med.

Embla n. g.



T. æquivalvis, postice hians, truncata; ligamentum internum *c* foveæ utriusque valvæ insertum, ante quam in v. d. dens cardinalis *b*, in v. s. fossa cardinalis *b'*; in v. s. dens lateralis anticus *a* et posticus *d*, in v. d. fossa late-

ralis *d'*, dentes laterales nulli. Impressio palliaris lata, duplicata, postice leviter sinuosa. Animal pallio ventre aperto, postice longe cirrigero, siphonibus instructum. Specimen unicum mancum vidi.

319. *E. Korenii* n. — *T. ovata*, ventricosa, subæquilatera, antice rotundata, postice truncata, alba, aculeis minutissimis creberrimis truncatis aspera, epidermide tenui; umbones prominentes, paullum ante medium siti, incurvi et antrorsum flexi; lunula distincta, brevissima, lata; margo lunularis leviter concavus, ligamentalis nonnihil arcuatus, ventralis levissime sinuatus, posticus angulato-truncatus, hians, plica subduplicata obsoleta ab angulo inferiore ad umbonem currente; cardo v. s.: dens lateralis anticus *a* obsoletus, marginalis; fossa cardinalis *b'* profunda, rotundato-trigona, infra aperta; fovea ligamenti *c* subovalis, longitudinalis, antice et infra callo definita, postice aperta; dens posticus *d* laminaceus, marginalis; cardo v. d.: dens card. *b* brevis, validus, prominens, apice truncato fissus, superne sulcatus; fovea ligamenti *c* oblonga, obliqua, fossa postica *d'*, illæ proxima, triangularis; impressio muscularis antica ovata, posterior major, rotundata, utraque superne lobo aucta; impressio palliaris interna lacera, postice sinu levi, externa integra; $\frac{8.4}{10}$ mm. (KOREN dd.) Bergen.

Thracia LEACH.

320. *T. convexa* (Mya) WOOD, (Anatina) TURT., (Amphidesma) FLMG., (Thracia) BROWN, THORPE, = *T. declivis* MACG. Boh.
321. *T. phaseolina* (Amphidesma) LAMK., (Thracia) KIENER, COUTH., PHIL., *annon* = *A. declivis* TURT.? (*non* PENN., DON. 82, BROWN, quæ = *M. pubescens* PULT.), *annon* = *T. pubescens* MACG.? — Processus cardinalis longitudinalis, subangustus, sed quam in præcedente nonnihil robustior, ossiculum validum; testa tenuissime scabra.
322. *T. distorta* (Mya) MONT., DILLW., (Anatina) TURT. — Processus cardinalis prominulus, semiovalis; ossiculum validum; sinus pal-

liaris parum profundus, arcuatus, angulus subrectus; testa jam antice, jam postice longior. Bergen — Finm.

323. *T. prætenuis* (Mya) PULT., MONT., (Anatina) TURT., MACG., (Amphidesma) FLMG., (Ligula) BROWN, (Cochlodesma) COUTH., *anon* = *A. oblonga* PHIL.? quæ modo magis compressa videtur. — Processus cardinalis cochleariformis, validus, antrorsum obliquus, postice ad basin e minore parte triangulari subplanus; parti cavæ inseritur cartilago valida cardinalis fusca, parti planæ ligamentum minutum, semilunatum, viride, fere omnino internum; ossiculum gracile; testa forma varians; $\frac{3}{10}$, crass. 9,2; $\frac{2}{8}$, cr. 9,3; $\frac{2}{5}$ cr. 7 mm. Boh. — Bergen.

Lyonsia TURT.

Magdala "LEACH", BROWN, Myatella BROWN, Osteodesma DESH., Pandorina "SCACCHI", PHIL.

324. *L. norvegica* (Mya) CHEMN., GRAY, A. N. H. IV, 305 c. syn. bona; *an* vere = *A. rostrata* LAMK.? quæ Thraciam potius spectare videtur. Boh. — Norv.

Næra GRAY.

Cuspidaria NARDO.

T. sæpe nonnihil inæquivalvis, v. d. (an semper?) minore, minus convexa; umbones recti l. vix antrorsum vergentes, sæpe obliqui; margo ligamentalis v. d. illum v. s. superans; ligamentum tenue angustum, per rostrum continuatum; area sæpius distincta, saltem in v. s., ut etiam haud raro lunula. Lamina cardinalis angusta; in utraque v. processus cardinalis canaliculatus, obliquus, jam prominulus, fere cochleariformis, jam angustus longitudinalis, fossa præditus profunda, per incisuram marginis sub umbone exiente, cartilaginem foveante, jam e minore parte, jam fere totam osteam; in v. d. dens lateralis posticus, in v. s. callus modicus respondens; in utraque costa a cardine versus marginem ventralem extensa; impressiones musculorum magnæ; impressio palliaris sinum parum profundum format et angulum fere rectum, dein margini parallela.

325. *N. rostrata* (Mya) SPGLR., CHEMN., DILLW. (*non* = "Tellina cuspidata OLIVI, (Corbula) BRONN", PHIL.; *non* = *Anatina longirostris* LAMK.) — *T. fragilis*, ovata, antice rotundato-producta, postice contracta et longe rostrata, tenuissime concentrice striata, processu cardinali parvo, dente approximato minuto, costa obsoleta; alt. 6,5, long. præter rostr 8, cum r. 12 mm. — *T. ventricosa*, oblonga; margo ligamentalis rectus, absque angulo l. sinu continuatus in lunularem, sensim arcuatum, productum, cum antico angulum levem rotundatum formantem; margo ventralis postice profunde sinuatus; rostrum lineare, superne rugosum. Boh. — Norv.

326. *N. obesa* n. — *T. tenuis*, rotundato-ovata, postice in rostrum breve sensim contracta, concentrice tenue striata, processu cardinali angusto, demisso, dente remoto, humili, costa subobsoleta; alt. 12, long. pr. r. 13,5, c. r. 18,5, crass. 9, 4. — *T. inflata*, margo ligamentalis vix concavus, sub angulo obtusissimo in lunularem abiens, primo breviter subrectum, deinde sensim arcuatum; sinus ventralis posticus parum profundus; ossiculum minutum, cartilaginis vix $\frac{1}{3}$ occupans, subcretaceum. Boh.
327. *N. brevirostris* (Thracia) BROWN, *annon* = *Erycina cuspidata* Risso? (*non* = "*T. cuspidata* OLIVI" (Corbula) PHIL., sed opus OLIVI comparare non licuit; BROCCHI dentes duos laterales describit.) — *T. solidula*, subtrigona, exaltata, postice sensim contracta, modice rostrata, concentrice rugosa, processu cardinali prominulo, dente laterali robusto, triangulari, recurvo, costa valida; alt. 12,2, long. pr. r. 12, c. r. 16,4, crass. 9,3 mm. — *T. inflata*, antice planulata; margo ligamentalis leviter concavus angulum fere rectum format cum lunulari, primum breviter arcuato, deinde ad medium fere latus anticum subrecto; sinus ventralis posticus distinctus; ossiculum longum, subcretaceum; lunula distinguenda, area lanceolata. Boh.
328. *N. sulcata* n., *an* = *N. costellata* (Corbula) DESH., HINDS.? (Specimina nostra in coll. Cummingiana huic speciei adnumerat HINDS A. N. H. XIII, 307, tabulam citans DESH. MOR. 7, f. 1,2, 3, sed longe diversam sub eodem nomine describit PHIL. ad t. ejusd. op. 24 f. 2 relegans; neutram comparare licuit); *C. Wællii* NYST affinis. — *T. subtenuis*, rotundato-ovata, postice in rostrum gracile tubulare contracta, costis radiata 15—20, postice remotis, processu cardinali parvo, depresso, dente contiguo brevi, robusto, costa valida; alt. 6, long. pr. r. 7, c. r. 10,5, cr. 4,5 mm. — *T. tumida*, antice et postice lævigata, costula rostri diagonalis; margo ligamentalis satis concavus, absque angulo in lunularem continuatus, primo elatum, deinde ad medium latus subrectum; sinus ventralis profundus; rostrum fere assurgens; ossiculum cardinale validum, solidum, longum, nitidum; lunula distinguenda, area in v. d. angustissima. Boh. — Bergen.
329. *N. vitrea* n. — *T. fragilissima*, lævis, ovata, in rostrum breve sensim producta, plica profunda, processu cardinali angusto, longitudinali, antice dente munito, ossiculo magno, lato, laminaceo, dente laterali obsoleto, costa gracili elevata; alt. 5,5, long. pr. r. 5,6, c. r. 7,6 mm. — *T. inflata*, pellucida; margines dorsales subrecti angulum formant obtusum; sinus ventralis parum profundus; rostrum rotundatum; costa ab umbone fere abiens, in plicam producta usque ad marginem ventralem. — Ad *Anatinellam* accedere videtur. Cave ne in hac et affinis ossiculum fractum pro dente habeas. Boh.

Corbula

Corbula BRUG.

330. *C. gibba* (Tellina) "OLIVI", BROCCHI, = *Mya inæquivalvis* MONT.,
= *C. nucleus* LAMK., TURT., PHIL., = *C. striata* FLMG.
Kullen — Norv.
331. *C. rosea* "LEACH", BROWN. Boh.

Mya L.

332. *M. arenaria* L., AUCT., O. FABR., GOULD. Kullen — Norv.
333. *M. truncata* L., AUCT., O. FABR., GOULD. Kullen — Finm.
334. *M. Swainsonii* (Sphenia) TURT., FLMG., BROWN, MACG. — Vera
Myæ species a pullis *M. arenariæ* plane diversa testa oblonga,
minus tumida, margine dorsali obtusangulo, postice recto, um-
bonibus minutis, ante medium sitis, fine postica attenuata, trun-
cata, dente card. v. s. angustiore, sinu palliari minus amplo, el-
liptico, mediam t. vix attingente; $\frac{4.8}{8.4}$ mm. Boh. — Finm.

Panopæa MEN.

335. *P. norvegica* (Mya) SPGLR. (non *M. norvegica* CHEMN., GM.) =
Glycymeris arctica LAMK., (Panopæa) DESH., GOULD, WOODHANL.,
= *P. Spengleri* VAL. = *P. Bivonæ* PHIL. — Valvam dextram
unicam possideo in sinu codano a piscatore inventam forma elon-
gatiore ab icone SPENGLERI, vix vero specie diversam. Long. ha-
bet 100 mm., altitudinem 45 mm. Antice brevior est, umbone
in $\frac{1}{3}$ antica sito, postice latior, truncata, sed vix oblique. Nym-
phæ in dorso prominulæ, intus parum tumidæ, marginis dorsalis
postici $\frac{1}{3}$ occupant. Impressio pallii interrupta, maculosa. Icon
PHILIPPI haud male quadrat, sed latus anticum quam in nostra
longius, magis declive. Sow. M. C. 610, 611 comparare non
licuit. Sin cod. — "Norv."

Solen L.

336. *S. ensis* L., AUCT., GOULD, (an PHIL.?) Boh. — Finm.
337. *S. vagina* L. Norv.
338. *S. coarctatus* GM., CHEMN., LAMK., = *S. antiquatus* PULT.,
MONT., LAMK., (Psammobia) TURT., (AZOF) "LEACH", BROWN, = *S.*
cultellus PENN., (non L.). Boh.
339. *S. pellucidus* PENN., MONT., = *S. pygmæus* LAMK.
Kullen — Norv.

Pholas L.

340. *P. candida* L., AUCT., = *P. papyracea* "SOLANDER" (cum di-
agnosi *P. papyraceæ* "SOL.", TURT.!) SPGLR., Nat. H. S. Skr. II,
I, 98, t. 1 f. 4. Norv.


341. *P. dactylus* L., Auct. Norv.
 342. *P. crispata* L., Auct. Norv.

***Xylophaga* TURT.**

343. *X. dorsalis* TURT., = *Pholas xylophaga* DESH. Norv.

***Teredo* L.**

344. *T. navalis* L., SELL., DESH., in Cuv. R. A. = *T. batava* SPGLR.
 — *Opercula lunata, bicuspidata.* Boh. — Norv.
 345. "*T. norvagica* SPGLR.", = *T. navalis* TURT., DESH. Alg. —
Opercula oblonga. "Norv."



Henning Oppermann

vorm. Rudolf Geering

Buchantiquariat und
Buchhandlung

Basel, Blumenrain 27
(Schweiz)

CALIF ACAD OF SCIENCES LIBRARY



3 1853 00027 3529